

21/145 ✓

1- Nhân hộp:

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/6/2014

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

HARD CAPSULE

10 blisters x 10 capsules

ATM

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Each capsule contains:
 Radix Polysciacis extract 10/1.... 150mg
 Powdered Ginkgo extract 40mg
 Excipients.....qs 1 capsule

Indications, Contraindications, Dosage and Administration:
See the enclosed insert.

Storage: Store in a dry place, protect from light, temperature below 30°C.

Specification: Mfg's standard.

Keep out of the reach of children
Carefully read the insert before use

Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

VIÊN NANG CỨNG

Hộp 10 vỉ x 10 viên

SDK/ Reg. No.:

Số lô SX/ Lot No.:

NSX/ Mfg.Date:

HD/ Exp. Date:

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Mỗi viên nang chứa:

Cao độc đinh lăng 10/1 150mg
(*Extractum Radix Polysciacis spissum*)
Cao bạch quả 40mg
(*Extractum Folium Ginkgo Siccus*)
Tá dược vớ 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng và Cách dùng:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

Sản xuất tại: **Cty CP Dược VTYT Hải Dương**
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương

Phân phối bởi: **Cty CP Dược ATM**
89F Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội

<https://trungtamthuvoc.com>

2- Nhân vi:

Ngày tháng năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO ATM

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Cao đặc Đinh lăng 10:1 (*Extractum Radix Polysciacis spissum*) 150mg

(tương đương với 1500mg Đinh lăng (*Radix Polysciacis*))

Cao Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo Siccus*) 40mg

Tá dược: Avicel, Calci carbonat, Bột Talc, Magnesi stearatvd 1 viên.

Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

Người đang chảy máu.

Tác dụng không mong muốn:

Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày.

Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

Uống sau bữa ăn

Người lớn: 2 viên/lần. Ngày uống 2 - 3 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/lần. Ngày uống 2 lần.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tương tác với các thuốc khác:

Không dùng đồng thời với thuốc chống máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chỉ huyết.

Quá liều và xử trí :

Quá liều và xử trí :

Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn.
Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

Nhà sản xuất:

Cty CP Dược VTYT Hải Dương
Số 102, Phố Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi,
TP. Hải Dương
ĐT/ Fax: 0320.3853848

Nhà phân phối:

Cty CP Dược ATM
Số 89F, phố Nguyễn Văn Trỗi,
Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT/ Fax: 04.36648947



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng