



Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTH**SACHET

GMP - WHO

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTH**SACHET

Cao khô lá Bạch quả
Cao đặc rễ Đinh lăng



Hộp 1 túi x 20 gói x 3 gam

THÀNH PHẦN:

Cho 1 gói 3 gam thuốc gồm
Cao khô lá Bạch quả 75 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng 150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)
Tá được vừa đủ 1 gói.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và điều trị các bệnh:
- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: 1 gói / lần. Ngày uống 1-2 lần.
Trẻ em trên 12 tuổi: 1 gói / lần. Ngày uống 1 lần

Mẫu nhãn
Hộp 1 túi x 20 gói x 3 gam
Ghi chú: xxx là số tự nhiên từ 001 đến 999

GMP - WHO

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTH**SACHET

Cao khô lá Bạch quả
Cao đặc rễ Đinh lăng



Hộp 1 túi x 20 gói x 3 gam

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng

Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903 220 367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX: xxx

NSX:

HD:





Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTHSACHET**

GMP - WHO

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTHSACHET**

Cao khô lá Bạch quả
Cao đặc rễ Đinh lăng



Hộp 1 túi x 25 gói x 3 gam

THÀNH PHẦN:

Cho 1 gói 3 gam thuốc cốt
Cao khô lá Bạch quả 75 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng 150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)
Tá được vừa đủ 1 gói.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và điều trị các bệnh:
- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: 1 gói / lần, Ngày uống 1-2 lần.
Trẻ em trên 12 tuổi: 1 gói / lần, Ngày uống 1 lần

Mẫu nhãn
Hộp 1 túi x 25 gói x 3 gam

Ghi chú: xxx là số tự nhiên từ 001 đến 999

GMP - WHO

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTHSACHET**

Cao khô lá Bạch quả
Cao đặc rễ Đinh lăng



Hộp 1 túi x 25 gói x 3 gam

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

SDK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng

Tho, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903 220 367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Tpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Tpharma.vn

LSX: xxx

NSX:

HD:





Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTHSACHET**

GMP - WHO

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTHSACHET**

Cao khô lá Bạch quả
Cao đặc rễ Đinh lăng



Hộp 1 túi x 30 gói x 3 gam

THÀNH PHẦN:

Cho 1 gói 3 gam thuốc gồm
Cao khô lá Bạch quả 75 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng 150 mg
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)
Tá được vừa đủ 1 gói.

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và điều trị các bệnh:
- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Người lớn: 1 gói / lần. Ngày uống 1-2 lần.
Trẻ em trên 12 tuổi: 1 gói / lần. Ngày uống 1 lần

Mẫu nhãn
Hộp 1 túi x 30 gói x 3 gam

Ghi chú: xxx là số tự nhiên từ 001 đến 999

GMP - WHO

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTHSACHET**

Cao khô lá Bạch quả
Cao đặc rễ Đinh lăng



Hộp 1 túi x 30 gói x 3 gam

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

SĐK:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông

Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903 220 367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

LSX: xxx

NSX:

HD:





Nhãn gói 3 gam

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA**

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903 220 367 * Hotline: 0906.59.98.98 * Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTHSACHET** Cao khô lá Bạch quả - Cao đặc rễ Đinh lăng



Gói 3 gam

THÀNH PHẦN: Cho 1 gói 3 gam thuốc gồm

Cao khô lá Bạch quả 75 mg

Cao đặc rễ Đinh lăng (*Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ)*) 150 mg

Tà được vừa đủ 1 gói

LSX: xxx

HD:



túi nhóm

Hoạt huyết **DƯỠNG NÃO DTH**SACHET

LSX:

HD:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH SACHET

1. Tên thuốc:

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 01 gói x 3 gam thuốc cốm

Thành phần hoạt chất:	
Cao khô lá Bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>)	75 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (<i>Extractum Polysciacis fruticosae spissum</i>) Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ) (<i>Polyscias fruticosa</i>)	150 mg
Thành phần tá dược:	
Đường trắng, Lactose monohydrat, Polyvinyl pyrrolidon K30, Methylparaben, Propylparaben vừa đủ 1 gói.	

4. Dạng bào chế: Thuốc cốm

Mô tả sản phẩm: Thuốc cốm dạng hạt, khô toí, màu vàng nâu đến nâu, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng

5. Chỉ định: Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi

6. Cách dùng, liều dùng:

Người lớn: 1 gói/ lần. Ngày uống 1-2 lần.

Trẻ em trên 12 tuổi: 1 gói/ lần. Ngày uống 1 lần

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai
- Người rối loạn chảy máu, đang chảy máu

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Ở những bệnh nhân có bệnh lý có xu hướng tăng nguy cơ chảy máu (chảy máu nội tạng), đang điều trị bằng thuốc chống đông, thuốc kháng tiểu cầu, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.



Thuốc (có chứa Bạch quả) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Để phòng ngừa, cần ngừng dùng thuốc này 3 đến 4 ngày trước khi phẫu thuật.

Ở bệnh nhân động kinh, không thể loại trừ tăng khởi phát cơn co giật do uống thuốc (có chứa Bạch quả).

Không nên sử dụng đồng thời thuốc (có chứa Bạch quả) với Efavirenz

- Sản phẩm có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm)
- Sản phẩm có chứa lactose: Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucosegalactose không nên dùng thuốc này.
- Sản phẩm có chứa đường trắng: Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp fructose, kém hấp thu glucosegalactose hoặc thiếu hụt enzym sucrase-isomaltase không nên dùng thuốc này.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: Không dùng
- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy nhiên, do tác dụng không mong muốn của thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt nên cần thận trọng khi lái xe, vận hành máy móc trong khi dùng thuốc này

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- *Tương tác:*

- + Bạch quả có thể làm giảm nồng độ efavirenz trong huyết tương do cảm ứng Cytochrome CYP3A4, do đó không nên sử dụng đồng thời thuốc này với efavirenz.
- + Bạch quả khi dùng chung với các thuốc chống đông máu (ví dụ: phenprocoumon, warfarin) hoặc thuốc kháng tiểu cầu (ví dụ: clopidogrel, axit acetylsalicylic và các thuốc NSAIDs), hiệu quả của thuốc có thể bị ảnh hưởng.
- + Các nghiên cứu hiện có với warfarin không cho thấy sự tương tác giữa warfarin và Bạch quả, nhưng cần theo dõi khi bắt đầu điều trị, khi đổi liều, khi kết thúc điều trị với thuốc có chứa Bạch quả, hoặc khi đổi thuốc
- + Một nghiên cứu về tương tác với Talinolol cho thấy Bạch quả có thể ức chế P-glycoprotein tại ruột. Điều này có thể làm tăng phơi nhiễm của các thuốc nhạy cảm với P-glycoprotein tại ruột như dabigatran etexilate. Do đó cần hỏi ý kiến bác sĩ khi dùng kết hợp thuốc có chứa Bạch quả và dabigatran.

+ Một nghiên cứu về tương tác thuốc cho thấy C_{max} của nifedipine có thể tăng khi dùng cùng với Bạch quả. Ở một số trường hợp, mức tăng có thể lên tới 100% gây nên chóng mặt và tăng bốc hỏa.

- *Tương kỵ:*

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Sản phẩm chứa Bạch quả có thể gây ra các tác dụng phụ bao gồm: đau đầu, chóng mặt, đánh trống ngực, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chảy máu và phản ứng quá mẫn ở da.

Thông báo ngay cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

- Quá liều: khi dùng thuốc quá liều có thể xảy ra: ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Xử trí: Nếu thấy có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc quá liều, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 túi (OPP30/AL06/OPP40) x 20 gói (PET12/AL06/OPP70) x 3 gam

Hộp 1 túi (OPP30/AL06/OPP40) x 25 gói (PET12/AL06/OPP70) x 3 gam

Hộp 1 túi (OPP30/AL06/OPP40) x 30 gói (PET12/AL06/OPP70) x 3 gam

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367; Hotline 0906599898

Ngày 26 tháng 7 năm 2024
CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Đăng Hùng