




THÀNH PHẦN:
Cao khô lá bạch quả (Extractum ginkgo biloba): 10 mg. Tương đương với flavonoid: 2,5 mg. Cao đặc rễ đinh lăng (Extractum radix polyciasis): 150 mg. Tương đương với rễ đinh lăng (Radix polyciasis): 750 mg. Tã được vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:
Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh, di chứng sau tai biến mạch máu não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: - Người lớn: Mỗi lần uống 2 - 3 viên, ngày 2 đến 3 lần.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 đến 3 lần.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: Số 93 Lĩnh Lang - Ba Đình - Hà Nội
Nhà máy sx: CN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Địa chỉ: Lô M1 đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định
Điện thoại: 024.37666912 - 0226.3670733



Kích thước hộp: 12.5 x 7.4 x 4.1 cm



Kích thước vỉ: 10.6 x 6.1 cm



HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO

THÀNH PHẦN:
Cao khô lá bạch quả (Extractum ginkgo biloba): 10 mg. Tương đương với flavonoid: 2.5 mg. Cao đặc rễ đinh lăng (Extractum radix polyciasia): 150 mg. Tương đương với rễ đinh lăng (Radix polyciasia): 750 mg. Tã được: vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:
Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất môi mắt thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh, di chứng sau tai biến mạch máu não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

TRUONG THO PHARMA

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: - Người lớn: Mỗi lần uống 2 - 3 viên, ngày 2 đến 3 lần.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 đến 3 lần.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
SĐK:

Số lô SX:
NSX:
HD:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Trụ sở: Số 82 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội
Nhà máy và CN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Địa chỉ: Lô M1 Đường 8/3, Khu công nghiệp Hòa Tiến, Thanh Bình
Điện thoại: 04.37968812 - 0303.3870783

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO



Kích thước vỉ: 10.6 x 6.1 cm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

Viên nén bao đường

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tên thuốc: HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Thành phần:

Cao khô lá bạch quả (*Extractum ginkgo biloba*).....10 mg
Tương đương với flavonoid.....2,5 mg
Cao đặc rễ đinh lăng (*Extractum radix polyciasis*).....150 mg
Tương đương với rễ đinh lăng (*Radix polyciasis*).....750 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tá dược gồm: Amidon, magnesi carbonat, lactose, PVP K30, magnesi stearat, đường trắng, calci carbonat, talc, titan dioxyd, erythrosin, parafin rắn, than hoạt, cồn 96⁰, nước tinh khiết, nipagin, nipasol

Dạng bào chế: Viên nén bao đường.

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp 1 vỉ x 20 viên.

Dược lý và cơ chế tác dụng:

- Lá bạch quả chứa heterosit flavonic và hợp chất tecpenic làm tăng sự tưới các mô, giúp tuần hoàn máu qua các động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, bảo vệ hệ mạch máu, chữa chứng giảm trí tuệ của người già, ù tai, nghe kém do thiếu máu cục bộ, khắp khiếm cách hồi do thiếu máu cục bộ
- Đinh lăng có tác dụng làm tăng sức lực, giảm mệt mỏi, chữa suy nhược cơ thể, tăng sức đề kháng, tăng sự thích nghi với môi trường sống bất lợi, an thần giảm đau.


Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh, di chứng sau tai biến mạch máu não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

- Trường hợp quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai, người có rối loạn về máu, người đang xuất huyết, rối loạn đông máu.



Cách dùng và liều dùng:

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 - 3 viên, ngày 2 đến 3 lần.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 đến 3 lần.

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có báo cáo.

Kiên kỵ: Chưa có báo cáo.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Không dùng cùng thuốc chống động kinh, chống kết tập tiểu cầu.

Tác dụng không mong muốn: Hiện tại chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy thuốc có hiện tượng bạc màu, hỏng hoặc có những dấu hiệu khác lạ và báo ngay cho nhà sản xuất biết.

Tên địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Trụ sở: Số 93 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Địa chỉ: Lô M1 đường N3, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định

Điện thoại: 04.37666912 - 0350.3670733

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo cho ngay bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

1. Tên sản phẩm: HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

2. Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Cao khô lá bạch quả 10 mg, Cao đặc rễ đinh lăng 150 mg.

Tá dược: Amidon, magnesi carbonat, lactose, PVP K30, magnesi stearat, đường trắng, calci carbonat, talc, titan dioxyd, erythrosin, parafin rắn, than hoạt, cồn 96⁰, nước tinh khiết, nipagin, nipasol vừa đủ 1 viên

3. Mô tả sản phẩm: Viên bao đường hình tròn, màu đen, nhân bên trong màu nâu xám, vị ngọt hơi đắng.

4. Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp 1 vỉ x 20 viên.

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?

Thuốc dùng trong các trường hợp sau:

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh, di chứng sau tai biến mạch máu não.
- Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng: Dùng đường uống:

- Người lớn: Uống 2-3 viên/lần, ngày 2-3 lần.
- Trẻ em: Uống 1 viên/lần, ngày 2-3 lần.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai, người có rối loạn về máu, người đang xuất huyết, rối loạn đông máu.

8. Tác dụng không mong muốn?

Chưa có tài liệu ghi nhận

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

- Không dùng cùng thuốc chống động kinh, chống kết tập tiểu cầu.


10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Uống ngay khi nhớ ra

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:



Chưa có tài liệu ghi nhận.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Nếu có bất thường nên đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, chăm sóc.

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Chưa có báo cáo.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:

- Trẻ dưới 5 tuổi

16. Hạn dùng của thuốc:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

17. Tên, địa chỉ, biểu tượng của cơ sở sản xuất:

Chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
93 Linh Lang – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 0437666912

Fax: 0437666914

Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Lô M1 – đường N3 – KCN Hòa Xá – TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định

Biểu tượng nhà sản xuất:



19. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng