

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01/11/2018

IBAGALone
Cao cardus marianus 100mg

SX BQ: C.TY CP.D.P HÀ TÂY

IBAGALone
Cao cardus marianus 100mg

SX BQ: C.TY CP.D.P HÀ TÂY

IBAGALone
Cao cardus marianus 100mg

SX BQ: C.TY CP.D.P HÀ TÂY

IBAGALone
Cao cardus marianus 100mg

SX BQ: C.TY CP.D.P HÀ TÂY

IBAGALone
Cao cardus marianus 100mg

Số lô SX:

IBAGALone

HỘP 12 VÍ x 5 VIÊN NANG MỀM

IBAGALone

Cao cardus marianus 100mg

HỘP 12 VÍ x 5 VIÊN NANG MỀM



DNT
HATAPHAR

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao cardus marianus
(Tương đương với 70mg Silymarin, 30mg Silybin)
Ta được vd 1 viên
Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và các thông tin khác:
Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.
Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C.
Đề xả tâm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Tiêu chuẩn: TCCS

IBAGALone

Cardus marianus Ext. 100mg

BOX OF 12 X 5 SOFT CAPSULES



DNT
HATAPHAR

Composition: Each Soft capsules contains:
Cardus marianus Ext.
100mg
(equivalent to 70mg Silymarin, 30mg Silybin)
Excipients q.s.f.
1 soft capsule
other information:
See the leaflet enclosed
Specification: In-house
Storage: Keep in a dry place, below 25°C
Keep out of reach the children. Carefully read the accompanying before use

SDK (Reg. No):
Số lô SX (Lot. No):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

Sản xuất bởi:
C.TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội
Manufactured by:
Hà Tây Pharmaceutical J.S.C
La Khê - Hà Đông - Hà Nội City

07/11/18



Hướng dẫn sử dụng thuốc IBAGALONE

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao Cardus marianus	Một trăm miligam	100mg
(Tương đương với 70mg Silymarin, 30mg Silybin)		
Tá dược vđ		1 viên

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, lecithin, aerosil, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol, nước tinh khiết, titan dioxyd, vanilin, nipagin, nipasol, phẩm màu chocolate, tartrazin, sunset yellow, ethanol 90%).

- **Các đặc tính dược lực học:** Thuốc có tác dụng bảo vệ tế bào gan và chức năng của các cấu trúc xung quanh và trong tế bào gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và tăng hiệu quả thải độc của gan.
- **Các đặc tính dược động học:** Thuốc hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Thuốc đào thải qua mật kéo dài khoảng 24 giờ, đào thải qua thận thấp (khoảng 3%).
- **Chỉ định:** Hỗ trợ trong điều trị các trường hợp:
 - Viêm gan cấp và mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan.
 - Viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, do rượu và do hoá chất...
 - Tình trạng chán ăn, mệt mỏi, suy nhược cơ thể do suy tế bào gan.
 - Giải độc gan do rượu.
- **Cách dùng và liều dùng:** Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Trung bình:
Người lớn: Uống 2 viên/ lần x 3 lần/ngày.
Trẻ em trên 12 tuổi: Uống liều bắt đầu 12mg/kg/24giờ chia 3 lần, sau dùng liều duy trì 8mg/kg/24giờ
- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- **Thận trọng:** Nếu dùng thuốc không thấy có tiến triển tốt, khi có triệu chứng khó chịu xảy ra hoặc có tác dụng không mong muốn nên ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.
Việc điều trị bằng thuốc này không phải là biện pháp tránh khỏi nguyên nhân gây tổn thương gan.
Chưa có dữ liệu về thuốc này về việc dùng thuốc này cho trẻ em, vì vậy không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.
Dùng thuốc này cùng với thức ăn: không có hạn chế đặc biệt
- **Lái xe và vận hành máy móc:** không có hạn chế đặc biệt
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Chưa có dữ liệu về việc dùng Cardus marianus. Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú khi thật cần thiết theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Rất hiếm khi gặp, đã ghi nhận rối loạn tiêu hóa. Hãn hữu có thể gây phản ứng dị ứng, đỏ bừng mặt. Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc
- * **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Quá liều và xử trí:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
- * **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lò SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS 034-B-040-12

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Bá Lai