

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18 / 01 / 2013

27 - Dien Bien Phu - Ward 9 - Traviuh City - Traviuh Province - Vietnam

IBURAX

IBURAX



ANALGESIC



Box of 4 blisters x 10 capsules

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Bao quan noi kho, khong qua 30°C, tranh ánh sáng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay của trẻ em.

Chú dīnh, chōng chí dīnh, cǎch dūng-lién dūng:

Hộp 4 vĩ x 10 viên nang

**IBURAX**

IBURAX 100 capsules	IBURAX MEFENAMIC ACID 250mg ANALGESIC Box of 10 blisters x 10 capsules GMP-WHO
---	--

III. MẪU NHÃN HỘP 10 VỈ:



IBURAX ACID MEFENAMIC 250mg GIẢM ĐAU Hộp 10 vỉ x 10 viên nang GMP-WHO	IBURAX Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng tiêu dùng: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 89350761023023 Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm 27 Điện Biên Phủ - P9 - TP. Hà Nội - Tỉnh Hà Nội
---	--

IBURAX

Công thức:
- Acid mefenamic.....250 mg
- Tà được vừa đủ.....1 viên

Bảo quản nơi khô, không quá 30°C, tránh ánh sáng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay của trẻ em.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

TV. Pharm pharmaceutical joint-stock company
27 - Điện Biên Phủ - Ward 9 - Thanh City - Thanh Province

12



At

IBURAX

Acid mefenamic 250 mg

Công thức và trình bày:

- Acid mefenamic..... 250 mg.
- Tá dược(Acid mefenamic, Tinh bột mì, Avicel, PVP, Natri laurylsulfat, Aerosil, Magnesi stearat)..... v.d.1 viên.
- Viên bao phim, Vi 10 viên - hộp 04 vi, Vi 10 viên - hộp 10 vi.

Dược lực học:

- Acid Mefenamic là một thuốc kháng viêm không steroid có tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng viêm (liều cao). Cơ chế tác dụng: do thuốc ức chế prostaglandin synthetase do đó ngăn tạo ra prostaglandin, thromboxan, và các sản phẩm của cyclooxygenase.

Dược động học:

- Acid Mefenamic được hấp thu qua đường tiêu hóa, đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương sau 2 - 4 giờ. Thời gian bán thải thuốc trong huyết tương từ 2 - 4 giờ. Acid Mefenamic liên kết nhiều với protein huyết tương, thuốc chuyển hóa bởi Cytochrom P₄₅₀ thành acid 3-Carboxy Mefenamic, hơn 50% thuốc đào thải qua nước tiểu.

Chỉ định:

- Giảm đau từ nhẹ đến vừa trong các trường hợp: đau đầu, đau răng, đau sau khi sinh và sau khi phẫu thuật, đau bụng kinh.
- Bệnh cơ xương khớp: viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp.

Chống chỉ định:

- Loét dạ dày-tá tràng tiến triển.
- Dị ứng với Acid Mefenamic, Aspirin và các thuốc kháng viêm không Steroid tương tự khác.
- Người bị suy gan, suy thận.
- Người bệnh đang dùng thuốc chống đông, hen hay có thắt phế quản.
- Phụ nữ có thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ.
- Phụ nữ cho con bú.
- Viêm ruột.

Thận trọng khi dùng thuốc:

- Thuốc có thể gây buồn ngủ, thận trọng khi dùng cho người lái tàu xe, vận hành máy móc.

Tác dụng ngoại ý:

- Buồn ngủ, giảm tiểu cầu, thiếu máu tan huyết, thiếu máu bất sản.
- Có thể ngưng điều trị trong trường hợp xảy ra tiêu chảy, phát ban
- **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

Tương tác với thuốc khác:

- Tăng nguy cơ loét dạ dày khi phối hợp với các kháng viêm không steroid.
- Làm tăng độc tính trên máu của Methotrexat.
- Làm tăng tác dụng phụ trên thần kinh trung ương của các kháng sinh nhóm Quinolone.
- Làm gia tăng nồng độ Digoxin trong máu.
- Làm gia tăng tác dụng hạ đường huyết của các Sulfamid, tăng tác dụng của các thuốc kháng đông.
- Làm giảm hoạt tính của Furosemid và các thuốc lợi tiểu khác.

Sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc:

- Thận trọng khi dùng cho người lái tàu xe, vận hành máy móc vì thuốc gây buồn ngủ.

Sử dụng quá liều:

- Điều trị triệu chứng và hỗ trợ: rửa dạ dày, gây nôn, lợi tiểu, cho uống than hoạt.

Liều lượng và cách dùng:

- Uống theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo liều sau:
- **Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:** mỗi lần uống 1- 2 viên , ngày 2-3 lần.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM

27 Điện Biên Phủ, P9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Trà Vinh, ngày 28 tháng 11 năm 2012

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



DS. HÀ VĂN ĐỒNG