

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2014



ICapho-L
Ginkgo biloba

WHO-GMP 6 blisters x 10 soft capsules

ICapho-L
Ginkgo biloba
Ginkgo biloba ext.



■ **Composition:** Each soft capsule contains:
Ginkgo biloba extract (Extractum Folium Ginkgo bilobae siccum) 40mg
(equivalent to 9.6 mg Ginkgo flavonol glycosides)

■ **Indications:**

- Peripheral circulatory disturbances (intermittent claudication).
- Dizziness, vascular and degenerative tinnitus.
- Organic brain function disturbances with dementia symptoms such as tinnitus, headache, memory and attention deficiency, depression dizziness, etc...

■ **Administration, contraindications & other information:** See insert paper

■ **Storage:** Store in a hermetic container, below 30°C, protect from light

■ **Package:** 6 blisters x 10 soft capsules/box

Keep out of reach of children

Read insert paper carefully before use



SPK:
SỐ LO SX:
NSX:
HD

6 vỉ x 10 viên nang mềm

ICapho-L
Ginkgo biloba
Cao Bạch quả



■ **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao Bạch quả (Extractum Folium Ginkgo bilobae siccum) 40mg
(tương đương với 9.6mg Ginkgo flavonol glycosides)

■ **Chỉ định:**

- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên (chứng kẹp khiêng cách hớt).
- Chóng mặt, ù tai do nguyên nhân mạch máu hoặc thoái hóa.
- Rối loạn chức năng não nặng đi kèm những triệu chứng kiểu sa sút trí tuệ như ù tai, nhức đầu, giảm trí nhớ, rối loạn khả năng tập trung, trầm cảm, chóng mặt ...

■ **Cách dùng, chống chỉ định & các thông tin khác:** Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

■ **Bảo quản:** Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.


■ **Đóng gói:** 6 vỉ x 10 viên nang mềm/hộp

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

PHIL
Sân xuất tại
CÔNG TY TNHH PHILINTER PHARMA
25, đường số 3, KCN Việt Nam-
SINGAPORE, Thuận An, Bình Dương

GENERAL DIRECTOR
CÔNG TY TNHH PHILINTER PHARMA
TX. THUAN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
SOON CH HONG



Số lô SX, HD sẽ được dập trên vỉ

GENERAL DIRECTOR
CÔNG TY
TNHH
PHIL INTER
PHARMA
SOON OH HONG

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

ICAPHO-L GINKGO BILOBA

SDK:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: Cao Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo bilobae siccum*)..... 40 mg
(tương đương với 9,6 mg Ginkgo flavonol glycosides)

Tá dược: Polyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 4000, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, Ethyl vanillin, Titan dioxide, Màu vàng 203, Màu vàng số 5, Màu xanh dương số 1, Nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH

- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên (chứng khập khiễng cách hồi).
- Chóng mặt, ù tai do nguyên nhân mạch máu hoặc thoái hóa.
- Rối loạn chức năng não nặng đi kèm những triệu chứng kiểu sa sút trí tuệ như ù tai, nhức đầu, giảm trí nhớ, rối loạn khả năng tập trung, trầm cảm, chóng mặt, ...

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều thông thường ở người lớn là:

- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên, chóng mặt, ù tai: Mỗi lần uống 1 viên nang, mỗi ngày 3 lần; hoặc mỗi lần 2 viên, mỗi ngày 2 lần.
- Rối loạn chức năng não nặng: Mỗi lần 1 – 2 viên, ngày 3 lần; hoặc 3 viên, ngày 2 lần.

Liều dùng có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi của bệnh nhân hoặc mức độ của triệu chứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Phụ nữ có thai, khi đang chảy máu, nguy cơ chảy máu.

THẬN TRỌNG

Thận trọng chung

Vì thuốc này không phải là thuốc chữa cao huyết áp, không nên dùng thuốc này cho những bệnh nhân bị cao huyết áp mà cần có liệu pháp điều trị đặc biệt.

Dùng thuốc cho trẻ em

Kinh nghiệm dùng thuốc này cho trẻ em chưa đầy đủ. Vì vậy không nên dùng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không được dùng cao Bạch quả trong khi dùng các thuốc chống đông máu như heparin, warfarin hoặc các dẫn xuất coumarin.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Thử nghiệm ở động vật cho thấy thuốc không gây tác động quái thai. Tuy nhiên, không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú

Chưa biết thuốc có được tiết vào sữa mẹ hay không. Vì có nhiều thuốc được tiết vào sữa mẹ nên phải thận trọng khi dùng thuốc này cho phụ nữ đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hơi khó chịu ở đường tiêu hoá, nhức đầu, hoặc phản ứng dị ứng ngoài da có thể xảy ra nhưng hiếm.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*


QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 6 vỉ x 10 viên nang mềm/hộp.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường số 8, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương.

GENERAL DIRECTOR



SOON OH HONG



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng