



Cách dùng- liều dùng:
- Người lớn uống 6-8 viên mỗi ngày, chia 2 lần
- Trẻ em tùy tuổi uống 1-5 viên mỗi ngày
Đợt điều trị kéo dài từ 5-7 ngày.
Chống chỉ định:
Phụ nữ có thai, người mẫn cảm với các thành phần của thuốc
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 15-30°C
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Lô SX:
Ngày SX:
Hạn dùng:

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/12/2012



Thành phần: Cao khô dược liệu : 420mg chiết xuất từ:
Hoàng đằng (*Caulis et Radix Fibraureae*).....1,53g
Cỏ sữa lá nhỏ (*Herba Euphorbia thymifolia*).....0,78g
Lá mơ tam thể (*Folium Paederia tomentosa*).....1,06g
Tá dược: Lactose, Magnesi carbonate, Magnesi stearate.....vd 1 viên.

Chỉ định:
- Viêm đại tràng cấp và mãn tính với triệu chứng tiêu chảy và/ hoặc hội chứng ly hay rối loạn đại tiện
- Rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện như: đau bụng, sôi bụng, đầy bụng, ăn không tiêu, hay bị tiêu chảy khi ăn phải đồ ăn lạ
- Bệnh lý amip, bệnh lý trực khuẩn thường có biểu hiện bằng hội chứng ly: đau bụng quặn, mót rặn, đi ngoài phân lầy nhầy máu cá.



Công ty CPDP Nam Hà

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ThsDH: Hoàng Kim Tuyết

ĐƠN HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC

Viên nang **Ích tràng Naphar**

Thành phần: cho một viên nang:

Cao khô được liệu:	420mg
chiết xuất từ:	
- Hoàng Đằng (<i>Caulis et Radix Fibraureae</i>)	1,53g
- Cỏ sữa lá nhỏ (<i>Herba Euphorbia thymifolia</i>)	0,78g
- Lá mơ tam thể (<i>Folium Paederia tomentosa</i>)	1,06g

Tá dược: Lactose, Magnesi carbonat, Magnesi stearate..... vd 1 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Chỉ định

- Viêm đại tràng cấp và mãn tính với triệu chứng tiêu chảy và/ hoặc một hội chứng lý hay rối loạn đại tiện.
- Rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện như: đau bụng, sôi bụng, đầy bụng, ăn không tiêu hay bị tiêu chảy khi ăn phải đồ ăn lạ.
- Bệnh lý amip, bệnh lý trực khuẩn thường có biểu hiện bằng hội chứng lý: đau bụng quặn, mót rặn, đi ngoài phân lẫn nhầy máu cá.

Cách dùng và liều dùng

- Người lớn: uống 6-8 viên mỗi ngày, chia 2 lần
 - Trẻ em: tùy tuổi uống 1-5 viên mỗi ngày
- Đợt điều trị kéo dài từ 5- 7 ngày.

Chống chỉ định

Phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Tác không mong muốn: Hiện tại chưa phát hiện được tác dụng không mong muốn của thuốc. **Ghi chú:** “Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ.

Quy cách đóng gói: Vỉ 10 viên, hộp 6 vỉ

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất ghi trên nhãn. Nếu thấy viên thuốc bị mốc hoặc thấy hiện tượng khác lạ thì không được dùng và xin thông báo ngay cho nhà sản xuất biết.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 15°C — 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.



Sản phẩm được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

415 Hàn Thuyên- Nam Định. Tel: 03503.649408- 649504 Fax: 03503.644650



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ThSDH: *Hoàng Kim Tuyết*



Mẫu nhãn xin đăng ký



Số lô sx, hạn dùng: dập nổi trên vi



Công ty CPDP Nam Hà

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ThSDH: Hoàng Kim Tuyết