

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

■ Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
L-Ornithin L-Aspartat.....250mg
Tá được.....vừa đủ 1 viên

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

■ Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

■ Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

■ SBK:.....

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg



GMP- WHO

Sản xuất tại:

CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HAI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

■ Chỉ định:

- Tăng amoniac huyết liên quan đến bệnh lý gan cấp tính và mãn: xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, hóa chất, rượu...
- Hỗ trợ điều trị hôn mê gan, tiền hôn mê gan và bệnh não gan.

■ Chống chỉ định và các thông tin khác:

- Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

■ Liều dùng - Cách dùng:

- Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1-2 viên, uống sau bữa ăn.
Dùng thuốc trong 1-2 tuần.

• Liều duy trì: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc tối thiểu 4-5 tuần. Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh.

■ Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HAI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

GMP- WHO



INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

2- Nhãn vỉ:



MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

■ Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa: L-Ornithin L-Aspartat.....250mg Tá dược.....vừa đủ 1 viên	Số lô SX: Ngày SX: HD:
■ Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất	ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
■ Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS	ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
■ SDK:	

Hộp 6 vi x 10 viên nang mềm

INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg



GMP- WHO

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

INCAMix
L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

■ Chỉ định: - Tăng amoniac huyết liên quan đến bệnh lý gan cấp tính và mãn: xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, hóa chất, rượu... - Hỗ trợ điều trị hôn mê gan, tiền hôn mê gan và bệnh não gan.	■ Liều dùng - Cách dùng: - Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1-2 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc trong 1-2 tuần. • Liều duy trì: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc tối thiểu 4-5 tuần. Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh.
■ Chống chỉ định và các thông tin khác: - Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp	■ Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

GMP- WHO



INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

Hộp 6 vi x 10 viên nang mềm

INCAMix
L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

2- Nhãn vỉ:

INCAMix
L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

Số lô SX: HD:

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:



2- Nhãn vỉ:



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

GMP- WHO

■ **Liều dùng - Cách dùng:**

- Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1-2 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc trong 1-2 tuần.
- **Liều duy trì:** Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc tối thiểu 4-5 tuần. Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh.

■ **Bảo quản:** Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

■ **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất

■ **Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

■ **SĐK:**.....

INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg



**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

GMP- WHO

INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

■ **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:
L-Ornithin L-Aspartat.....250mg
Tá dược.....vừa đủ 1 viên

■ **Chỉ định:**

- Tăng amoniac huyết liên quan đến bệnh lý gan cấp tính và mãn: xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, hóa chất, rượu...
- Hỗ trợ điều trị hôn mê gan, tiền hôn mê gan và bệnh não gan.

■ **Chống chỉ định và các thông tin khác:**
- Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

INCAMix

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg



Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INCAMIX

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Màu Ponceau 4R.....vd 1 viên.)

Dược lực học:

L-Ornithin L-Aspartat: thuộc nhóm thuốc bảo vệ gan. Cơ chế hoạt động của thuốc là do 2 amino acid, thành phần của hoạt chất tham gia vào vòng urê. Bằng cách này, thuốc có tác dụng thúc đẩy quá trình giải độc ở gan và làm tăng quá trình bài tiết chất gây độc thần kinh amoniac.

Aspartat và ornithin là các chất nền đối với quá trình tổng hợp glutamate ở các tế bào gan bị tổn thương. Sự nghịch chuyển amin, bao gồm sự vận chuyển nhóm amino từ hầu hết các amino acid sang α -ketoglutarate, kết quả là chuyển thành glutamate rồi glutamine, một hợp chất phi độc tố. Đây là chất chủ yếu được hình thành ở các tế bào hệ thống thần kinh trung ương và các tế bào cơ. Glutamine nội bào là chất điều tiết sự tổng hợp của protein và khi lượng glutamine tăng sẽ tăng tổng hợp protein.

Aspartat tham gia vào vòng acid citric và làm chất xúc tác cho các phản ứng trên xảy ra dễ dàng để bảo vệ các acid amino khác và các acid amino đã tách. Nhóm amino glutamate tham gia vào quá trình tổng hợp carbamoylphosphate nhờ carbamylphosphate synthase. Việc chuyển nhóm carbamoyl tới ornithin trong vòng urê dẫn tới hình thành citrullin rồi đến urê. Trong hệ thống glutamate-glutamine có thể tích lũy được 1/4 hàm lượng amoniac được tạo ra trong quá trình chuyển hoá.

Các phản ứng mô tả ở trên xảy ra trong sự hiện diện của ornithine carbamoyl transferase. Ornithin là một chất hoạt hoá của carbamoyl phosphate synthase và carbamoyl transferase.

Aspartat tham gia vào quá trình tổng hợp pyrimidine giúp tái tạo lại acid nucleic ở các tế bào gan bị tổn thương.

Nhờ cơ chế hoạt động chính này mà ornithin aspartat được dùng chủ yếu trong điều trị suy gan với những biến chứng lên não do tăng nồng độ amoniac huyết.

Dược động học

Trong cơ thể thuốc bị tách ra thành 2 amino acid. Các thông tin về dược động học của Ornithin và Aspartat chưa được công bố đầy đủ.

Nửa đời sinh học của Ornithin là 0,4 giờ.

Chỉ định

- Tăng amoniac huyết liên quan đến bệnh lý gan cấp tính và mãn: xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, hóa chất, rượu ...

- Hỗ trợ điều trị hôn mê gan, tiền hôn mê gan và bệnh não gan.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân suy thận nặng.

Thận trọng

- Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Liều dùng - cách dùng

- Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc trong 1-2 tuần.

- Liều duy trì: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc tối thiểu 4-5 tuần. Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh.

Tác dụng không mong muốn

Hiếm gặp: buồn nôn, nôn, không cần ngưng điều trị.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tương tác thuốc:

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc với các thuốc khác.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Chưa có báo cáo về độ an toàn khi sử dụng L-ornithin L-aspartat cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú trong trường hợp cần thiết.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo, không dùng quá liều chỉ định.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS



Trình bày: Vi 10 viên; Hộp 3 vi, 6 vi, 10 vi, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý: - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/ Fax : 0320.853.848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

A blue ink signature.

