

29/84

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÉ DUYỆT
Lần đầu: 27/12/2013



<https://trungtamthuoc.com/>



Kataria granules sachet

Relief of the symptoms of Cystitis

KATARIA

granules

Sodium Citrate BP

CRANBERRY FLAVOUR



For preparation for peroral solution

Batch no.: Mfg. Date: dd/mm/yy Exp.date: dd/mm/yy

Composition: Each sachet (5.6 g) contains:
Sodium Citrate B.P.4.0 g
Indication: See Insert.
Storage conditions: Store below 30°C.

NOT RECOMMENDED FOR USE IN MEN AND CHILDREN.

Do not exceed the state dose.
Pour the content of sachet into the glass of water.
Stir till formation of clear solution.
Dosage: As directed by Physician.
Batch no., mfg. date and expiry date see the engraving on sachet.
Keep out of reach of children.
Read carefully the package Insert before use.

barcode



Kusum Healthcare
Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

Mfg. Lic. No.:





KATARIA Granules

Natri citrate 4g

THÀNH PHẦN

Mỗi gói chứa:

Hoạt chất: Natri citrate 4g

Tá dược: Sucrose, natri saccharin, Cranberry Flavour 191121

DƯỢC LỰC HỌC

Các đặc tính dược lực học:

Natri citrate được chuyển hóa thành bicarbonate, tạo điều kiện cho chứng khó tiểu thoát lui, được quan sát thấy trong viêm bàng quang, gây giảm acid nước tiểu do sự kiềm hóa.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Chưa có thông tin liên quan.

CHỈ ĐỊNH

Làm giảm các triệu chứng của viêm bàng quang ở phụ nữ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Nữ giới (người lớn):

1 gói được hòa tan trong cốc nước, uống 3 lần/ ngày trong vòng 2 ngày.

Dung dịch sau khi pha nên được dùng ngay lập tức.

Nam giới và trẻ em:

Không được khuyến cáo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với natri citrate và các thành phần khác của thuốc. Thuốc chống chỉ định cho bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh tim, tăng huyết áp, bệnh thận hoặc bệnh nhân đang ăn chế độ ăn kiêng muối thấp.

- Trong thời gian mang thai và cho con bú.

CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG VÀ THẬN TRỌNG LÚC DÙNG

Nếu triệu chứng kéo dài sau 2 ngày điều trị, cần phải tư vấn bác sĩ.

LÚC CÓ THAI VÀ LÚC NUÔI CON BÚ

Chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Vẫn chưa được biết.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa được biết

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Có 1 trường hợp duy nhất bị phát ban ở da và đau bụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU

Điều trị triệu chứng được sử dụng trong trường hợp quá liều không mong muốn của thuốc này.



ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 °C.

ĐÓNG GÓI: Hộp 6 gói

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc khi đã hết hạn sử dụng trên bao bì.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Sản xuất bởi: **KUSUM HEALTHCARE PVT. LTD.**

SP 289 (A), RIICO Industrial area, Chopanki, Bhiwadi (Raj.), Ấn độ.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



Qu

