

1. NHÃN TUÝP KEM BÔI DA KEZOLGEN 2% 5 g



2. MẪU HỘP 01 TUÝP KEZOLGEN 2% 5 g



3. NHÃN TUÝP KEM BÔI DA KEZOLGEN 2% 10 g



4. MẪU HỘP 01 TUÝP KEZOLGEN 2% 10 g



5. NHÃN TUÝP KEM BÔI DA KEZOLGEN 2% 15 g



6. MẪU HỘP 01 TUÝP KEZOLGEN 2% 15 g





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Kem bôi da KEZOLGEN 2%

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ

những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thành phần :

- **Thành phần dược chất:** Ketoconazol 2%

- **Thành phần tá dược:** Propylen glycol, Ceto stearyl alcol, Cremophor A6, Cremophor A25, Parafin dầu, Sandal wood, Natri sulfit, Nước tinh khiết.

Dạng bào chế: Kem bôi da.

Chỉ định

- Điều trị các nhiễm nấm ngoài da: nhiễm nấm ở thân (lác, hắc lào), nhiễm nấm ở bẹn, nhiễm nấm ở bàn tay, bàn chân do *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentaprophytes*, *Microsporum canis* và *Epidermophyton floccosum*. Điều trị nhiễm vi nấm *Candida* ở da và điều trị bệnh lang ben.

- Điều trị viêm da tiết bã- một bệnh lý da liên quan đến sự hiện diện của vi nấm *Malassezia furfur*.

Liều lượng và cách dùng

- **Nhiễm vi nấm *Candida* ở da, nhiễm nấm ở thân (lác, hắc lào), nhiễm nấm ở bẹn, nhiễm nấm ở bàn tay và lang ben:**

Bôi kem ngày 1- 2 lần tại các vùng bị nhiễm nấm và vùng da cận kề. Thời gian điều trị thông thường là: lang ben: 2- 3 tuần, nhiễm nấm men: 2- 3 tuần, nhiễm nấm ở bẹn: 2- 4 tuần, nhiễm nấm ở thân: 3- 4 tuần.

- **Nhiễm nấm bàn chân:**

Bôi kem ngày 1 lần tại các vùng bị nhiễm nấm và vùng da cận kề trong 4- 6 tuần hoặc bôi ngày 2 lần trong 1 tuần.

- **Viêm da tiết bã:**

Bôi kem ngày 1- 2 lần tại các vùng bị nhiễm nấm và vùng da cận kề. Thời gian điều trị thông thường là 2- 4 tuần, duy trì 1- 2 lần mỗi tuần.

Thời gian điều trị nên được tiếp tục ít nhất một vài ngày sau khi tất cả các triệu chứng biến mất. Nên xem lại chẩn đoán nếu như không thấy cải thiện về lâm sàng sau 4 tuần điều trị. Nên giám sát các biện pháp vệ sinh chung để kiểm tra các nguồn gây nhiễm hay tái nhiễm.

Kem ketoconazol 2% được sử dụng cho người lớn. Đối với bệnh nhân trẻ em dưới 17 tuổi: có rất ít dữ liệu về độ an toàn và hiệu quả.

Chống chỉ định

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng đặc biệt

Không dùng kem ketoconazol ở mắt.



Để ngăn ngừa hiện tượng dội ngược xảy ra khi ngừng dùng corticosteroid bôi tại chỗ sau một thời gian dài điều trị, người ta khuyên tiếp tục dùng corticosteroid bôi tại chỗ vào buổi sáng và dùng kem ketoconazol vào buổi tối, sau đó giảm dần rồi ngưng hẳn corticosteroid trong vòng 2- 3 tuần. Thuốc có chứa thành phần tá dược propylen glycol có thể gây kích ứng da; tá dược cetostearyl alcol có thể gây các phản ứng tại chỗ trên da (như viêm da tiếp xúc), hoặc kích ứng mắt và niêm mạc.

Có thai và cho con bú

Chưa có đủ thông tin nghiên cứu đối với dạng kem bôi da ketoconazol trên phụ nữ mang thai và cho con bú.

Người lái xe và vận hành máy móc

Ketoconazol dạng kem bôi da không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc

Chưa được biết.

Tác dụng không mong muốn (ADR)

Thường gặp (ADR > 1/100): ban đỏ, ngứa, cảm giác nóng rát bỏng da.

Ít gặp (1/100 > ADR > 1/1000): các rối loạn chung và tại vị trí bôi: chảy máu, khó chịu, khô da, viêm, kích ứng, dị cảm; rối loạn miễn dịch: mẫn cảm; rối loạn da và mô dưới da: ban bóng nước, viêm da tiếp xúc, phát ban, tróc da, da nhờn. Tác dụng ngoại ý: mệt mỏi.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và xử trí

- *Dùng ngoài da:* Bôi thuốc quá nhiều trên da có thể gây ban đỏ, phù và cảm giác nóng bỏng. Những triệu chứng này sẽ mất đi khi ngừng bôi thuốc.

- *Nuốt vào miệng:* Trong trường hợp vô ý nuốt thuốc, cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ và đánh giá triệu chứng.

Nhóm dược lý: Thuốc kháng nấm dùng tại chỗ, dẫn xuất imidazol và triazol

Mã ATC: D01AC08

Đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g. Hộp 1 tuýp 10g. Hộp 1 tuýp 15g. Hộp 1 tuýp 20g.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: ĐĐVN.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Số 46, đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Ngày 22 tháng 11 năm 2023

CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



CT HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC
DS Phan Văn Ngọc