


MẪU NHÃN THUỐC

1. Bao bì trực tiếp:
- Gói 2 g.

2. Bao bì ngoài:
- Hộp 10 gói x 2 g.



TP. Long Xuyên, ngày 8... tháng 7... năm 2019
TL TÓNG GIÁM ĐỐC
P.TGP, Quản Lý Chất Lượng
DS. Phạm Thị Bích Thủy

MẪU NHÃN THUỐC

Hộp 30 gói x 2 g
Box of 30 sachets x 2 g

Mã vạch

KIM TIỀN THẢO AGI 480

2. Bao bì ngoài:
- Hộp 30 gói x 2 g.

Rx Thuốc kê đơn



KIM TIỀN THẢO AGI 480



Gói 2 g

WHO-GMP

Thành phần: Mỗi gói chứa:
Cao khô Kim tiền thảo.....480 mg
(Tương đương với 6000 mg Kim tiền thảo)
Tá dược vđ.....1 gói

Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng
không mong muốn - Thận trọng - Liều
dùng - Cách dùng và các thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm
và ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng

Số lô SX/ Batch No.: XXXXXX
Ngày SX/ Mfg. Date: XX/XX/XX
HĐ/ Exp. Date: XX/XX/XX

Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình,
TP. Long Xuyên, An Giang
Cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty CP
Dược phẩm Agimexpharm - Bình Hòa
Lô C4, KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa,
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Rx Prescription drug



KIM TIỀN THẢO AGI 480



2 g sachet

WHO-GMP

Composition: Each sachet contains:
Extractum herbae
Desmodii styracifolii siccum.....480 mg
(Equivalent to 6000 mg Desmodii styracifolii)
Excipients q.s1 sachet

Indications - Contraindications -
Undesirable effects - Precautions -
Dosage - Administration and other
information: Read the leaflet insert.

Storage: Protect from humidity and light,
below 30°C.

Specification: In house.

Keep out of reach of children
Read carefully the instructions
before use

SDK/ Reg. No.: XX-XXXX-XX

Agimexpharm Pharmaceutical JSC.
27 Nguyễn Thái Học Street, Mỹ Bình Ward,
Long Xuyên City, An Giang Province, Vietnam
Manufacturer: Branch of Agimexpharm
Pharmaceutical JSC. - Bình Hòa
Lot C4, Bình Hòa Industrial Zone,
Bình Hòa Commune, Châu Thành District,
An Giang Province, Vietnam

TP. Long Xuyên, ngày ... tháng ... năm ...
TỔNG GIÁM ĐỐC
P.TGD Quản Lý Chất Lượng
AGIMEXPHARM
TP. LONG XUYẾN, AN GIANG
ĐS. Phạm Thị Bích Thủy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx

KIM TIỀN THẢO AGI 480

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thành phần công thức cho 1 gói:

Thành phần hoạt chất:

Cao khô Kim tiền thảo (*Extractum herbae Desmodii styracifolii siccum*).....480 mg
(*Tương đương với 6000 mg Kim tiền thảo*)

Thành phần tá dược: Đường trắng, Aspartam, Hương trà xanh.

Dạng bào chế: Thuốc cô màu nâu, có mùi thơm.

Chỉ định:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, viêm gan vàng da do ứ mật, viêm thận, phù thũng.

Liều dùng, cách dùng:

Cách dùng: Hòa thuốc vào khoảng 100 ml đến 200 ml nước ấm, khuấy đều và uống. Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước.

Liều dùng: Uống 02 gói/lần x 02 lần/ngày.

Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc:

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

Chống chỉ định:

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Người bị đau dạ dày nên uống thuốc lúc no.

Thành phần tá dược của thuốc này có aspartam: Là một nguồn của phenylalanin, chất này có thể gây nguy hiểm cho những người bị phenylketon - niệu.

Đường trắng (sucrose): Không nên dùng thuốc này cho bệnh nhân có các vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp fructose, hội chứng kém hấp thu glucose, galactose hoặc thiếu sucrase-isomaltase.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy nhiên với tác dụng lợi tiểu, thuốc có thể gây chóng mặt, hồi hộp. Nếu bị ảnh hưởng, cần thận trọng trong các hoạt động cần sự tỉnh táo.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Chưa có báo cáo về tương tác có thể xảy ra giữa Kim tiền thảo và các thuốc khác. Tuy nhiên cần

thận trọng nếu dùng thuốc này cùng lúc với các thuốc hạ huyết áp khác.

Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn:

Các phản ứng có hại được phân nhóm theo tần suất: Rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$), thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$), ít gặp ($1/1.000 \leq ADR < 1/100$), hiếm gặp ($1/10.000 \leq ADR < 1/1.000$), rất hiếm gặp ($ADR < 1/10.000$); không thể ước lượng tần suất được liệt kê "Chưa rõ tần suất".

Hạ huyết áp, chóng mặt và đánh trống ngực đã được ghi nhận ở một số bệnh nhân, có thể do tác dụng lợi tiểu của thuốc.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Cho đến nay chưa thấy có báo cáo về quá liều.

Qui cách đóng gói: Gói 2g. Hộp 10 hoặc 30 gói.

Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Điều kiện bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30°C , tránh ẩm và ánh sáng.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

Cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm – Bình Hòa

Lô C4 KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

An Giang, ngày 08 tháng 07 năm 2019

TL. Tổng giám đốc

PTGD: Quản lý Chất lượng



ĐS. Phạm Thị Bích Thủy