



Mẫu nhãn qui cách hộp 2 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - PVC)

Liều dùng, cách dùng:

- Mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2 - 3 lần.
- Liều tối đa 6 viên/ngày.

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA**

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ,

Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0903220367 - Hotline: 0906559898

Email: thpharmajsc2019@gmail.com

SDK:

LSX:


NSX:

HD:



Hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 viên nang cứng

• TIÊU NẾ
• TAN BẨM



LONG HUYẾT DTH

WHO - GMP

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Huyết giác (*Extractum Dracaenae siccus*)280mg

Tương đương với dược liệu Huyết giác (*Lignum Dracaenae*) 4,0 g


Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Thuốc dùng để điều trị trong các trường hợp và đập dẫn đến tụ máu chấn thương.
- Làm tan các vết bầm tím, tụ máu sưng đau do chấn thương, va đập, bị đòn, té ngã, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoạt động thể thao.

WHO - GMP

LONG HUYẾT DTH



• TAN BẨM
• TIÊU NẾ

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 viên nang cứng

LONG HUYẾT DTH



Mẫu nhãn qui cách hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - PVC)

Liều dùng, cách dùng:

- Mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2 - 3 lần.
- Liều tối đa 6 viên/ ngày.

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA**

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ,

Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0903.220.367 - Hotline: 0906.599.898

Email: thpharmajsc2019@gmail.com

SĐK:

LSX:


NSX:

HD:



Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên nang cứng

• TIÊU NẾ
• TAN BẨM



LONG HUYẾT DTH

WHO - GMP

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Cao khô Huyết giác (*Extractum Dracaenae siccus*)280mg

Tương đương với dược liệu Huyết giác (*Lignum Dracaenae*) 4,0 g

Tá dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Thuốc dùng để điều trị trong các trường hợp và dập tắt tụ máu chấn thương.
- Làm tan các vết bầm tím, tụ máu sưng đau do chấn thương, va đập, bị đòn, té ngã, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoạt động thể thao.

WHO - GMP

LONG HUYẾT DTH



• TAN BẨM
• TIÊU NẾ

Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên nang cứng

LONG HUYẾT DTH

LONG HUYẾT DTH



Mẫu nhãn qui cách hộp 2 vỉ x 12 viên (vỉ nhôm - PVC)

Liều dùng, cách dùng:

- Mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2 - 3 lần.
- Liều tối đa 6 viên/ ngày.

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA**

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ,

Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: 0903.220.367 - Hotline: 0906.599.898

Email: thpharmajsc2019@gmail.com

SDK:

LSX:


NSX:

HD:



Hộp 1 túi x 2 vỉ x 12 viên nang cứng

- TIÊU NÈ
- TAN BẦM



LONG HUYẾT DTH

WHO - GMP

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng

Gao khô Huyết giác (*Extractum Dracaenae siccus*)280mg

Tương đương với dược liệu Huyết giác (*Lignum Dracaenae*) 4,0 g


Tã được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Thuốc dùng để điều trị trong các trường hợp và đập dẫn đến tụ máu chấn thương.
- Làm tan các vết bầm tím, tụ máu sưng đau do chấn thương, va đập, bị đòn, té ngã, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoạt động thể thao.

WHO - GMP

LONG HUYẾT DTH



- TAN BẦM
- TIÊU NÈ

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 12 viên nang cứng

LONG HUYẾT DTH

Nhãn vỉ



Nhãn bao bì trung gian (túi nhôm)





TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

LONG HUYẾT DTH

1. Tên thuốc:

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 viên nang cứng

Thành phần dược chất:	
Cao khô Huyết giác (<i>Extractum Dracaenae siccus</i>)	280,0 mg
Tương đương với dược liệu Huyết giác (<i>Lignum Dracaenae</i>) 4,0 g	
Thành phần tá dược:	
Methylparaben, Propylparaben, Colloidal anhydrous silica, Calci carbonat, Microcrystallin cellulose M101, Magnesi stearat, Bột talc, Vỏ nang số 0	vừa đủ 1 viên

4. Dạng bào chế: Viên nang cứng

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, thân và nắp nang màu tím đỏ, bột thuốc bên trong màu nâu đỏ, mùi thơm dược liệu.

5. Chỉ định:

- Thuốc dùng để điều trị trong các trường hợp va đập dẫn đến tụ máu chấn thương.
- Làm tan các vết bầm tím, tụ máu sưng đau do chấn thương, va đập, bị đòn, té ngã, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoạt động thể thao.

6. Liều dùng – Cách dùng:

- Mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2-3 lần.
- Liều dùng tối đa 6 viên/ ngày.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai
- Người đang chảy máu, người bị rối loạn chảy máu.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Thuốc có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm).

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai
- Không có dữ liệu về sự an toàn của Huyết giác với phụ nữ cho con bú nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- *Tương tác:* Các thức ăn, đồ uống cay, nóng, tanh, lạnh làm giảm tác dụng của thuốc.
- *Tương kỵ:* Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Hiếm gặp. Tuy nhiên có thể gây rối loạn tiêu hoá, ỉa chảy. Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

- *Quá liều:* Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- *Xử trí:* Khi dùng quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 túi (nhôm) x 2 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên;

Hộp 1 túi (nhôm) x 3 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên;

Hộp 1 túi (nhôm) x 2 vỉ (nhôm/PVC) x 12 viên;

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903.220.367 - Hotline: 0906.599.898

Ngày: 25 tháng 07 năm 2024



Trịnh Đăng Hùng