https://trungtamthuoc.com/

LUBRINA

Natri carboxymethylcellulose 5 mg/ml

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần

Mỗi 1 ml chứa:

Thành phần hoạt chất:

Natri carboxymethylcellulose.....5 mg

Thành phần tá dược: Natri clorid, kali clorid, natri lactat, calci clorid hexahydrat, magnesi clorid hexahydrat, acid hydrocloric, nước cất pha tiêm vừa đủ.

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt

Mô tả: Dung dịch nhỏ mắt đóng trong ống nhựa.

pH: 6-7

Chỉ định

Dùng làm nước mắt nhân tạo, được sử dụng để điều trị các triệu chứng khô mắt như: Đau mắt, mắt khô, nóng, kích ứng hoặc ngứa do lượng nước mắt tiết ra không đủ để làm cho mắt ướt, hoặc do tiếp xúc với gió và nắng. Thuốc còn được dùng như một chất bảo vệ chống lại các kích thích khác.

Thuốc cũng được chỉ định để bôi trơn và làm ẩm kính áp tròng thẩm khí loại mềm và cứng, bằng cách nhỏ một giọt vào kính trước khi đặt vào trong mắt giúp làm giảm tình trạng khô, khó chịu và kích ứng mắt có thể liên quan đến việc đeo kính áp tròng và đệm kính.

Liều dùng và cách dùng

Liều lượng:

Nhỏ 1 – 2 giọt/lần vào mắt bị khô x 4 lần/ngày hoặc nhỏ khi cần thiết.

Cách dùng:

Để đảm bảo vô khuẩn và không gây thương tích cho mắt, cần tránh tiếp xúc đầu nhỏ giọt của ống vào mắt hoặc chạm vào bất cứ vật dụng nào khác.

Không sử dụng thuốc quá hạn sử dụng hoặc sử dụng thuốc quá thời gian mở nắp theo khuyến cáo.

Cần đảm bảo lọ thuốc phải được nguyên vẹn trước khi sử dụng lần đầu tiên. Sau khi sử dụng, phải đậy nắp kín và trước khi dùng ở lần tiếp theo, nên nhỏ bỏ đi 1 – 2 giọt trước khi nhỏ vào mắt để đảm bảo chế phẩm được vô khuẩn hoàn toàn.

Rửa tay trước khi sử dụng thuốc. Khi nhỏ thuốc vào mắt, dùng tay kéo nhẹ mi mắt để tạo thành túi. Dốc ngược ống **Lubrina**, dùng tay bóp nhẹ để nhỏ 1 – 2 giọt vào mỗi mắt. Chớp mắt 1 vài lần.

- Để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm không dùng dao kéo cắt đầu ống.
- Khi xoáy nắp, phần kim sẽ đâm vào thân ống, tạo lỗ nhỏ để nhỏ giọt. Thao tác thực hiện như sau:



Kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở



Để ống thẳng đứng, xoáy nắp theo chiều kim đồng hồ từ từ thật chặt, gioăng nhựa ở cổ nắp bung ra sẽ đồng thời làm phần kim nhọn ở phía trên trong nắp đi xuống làm thủng tạo một lỗ trên ống.



Giữ ống càng gần mắt càng tốt nhưng không chạm vị trí cần nhỏ mắt

Chống chỉ định

Mẫn cảm với natri carboxymethylcellulose hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

...ng không mong muốn của thuốc

https://trungtamthuoc.com/

- Ít gặp (≥1/100, <1/10)
Tác dụng không mong muốn xảy ra tại mắt như: Đau mắt, cảm giác có dị vật trong mắt, kích ứng mắt, ngứa mắt, rối loạn thị giác.
- Ít gặp (≥1/1,000, <1/100)
Rối loạn hệ thống miễn dịch: Quá mẫn, bao gồm cả dị ứng mắt.
Rối loạn mắt: Mờ mắt, chảy nước mắt, xung huyết mắt.
Chấn thương bề ngoài của mắt (do đầu lọ nhỏ mắt chạm vào mắt) và/hoặc mài mòn giác mạc

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Chưa được biết đến.

Khi sử dụng Lubrina đồng thời với các thuốc nhãn khoa khác, phải sử dụng các thuốc cách nhau ít nhất 15 phút.

Quá liều và cách xử trí

Việc quá liều natri carboxymethylcellulose sẽ không gây nguy hiểm. Nếu cảm thấy lo lắng, có thể gặp bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Khi dùng có thể đau nhức nhẹ thoáng qua hoặc nhìn mờ tạm thời. Nếu tình trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn, nên ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Để đảm bảo vô khuẩn hoặc tránh gây thương tích cho mắt, cần tránh tiếp xúc đầu nhỏ giọt của ống vào mắt hoặc chạm vào bất cứ vật dụng nào khác.

Không sử dụng dung dịch thuốc nếu thấy có sự đổi màu hoặc đục.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Do natri carboxymethylcellulose không có tác dụng dược lý nên có thể sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Thuốc có thể gây ra nhìn mờ tạm thời dẫn đến thị lực giảm do đó cần thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc khi đã sử dụng thuốc. Bệnh nhân nên chờ thị lực phục hồi trước khi tham gia lái xe hoặc vận hành máy móc.

Dược lực học

Nhóm thuốc dược lý: Thuốc nhãn khoa khác.

Mã ATC: S01XA20

Natri carboxymethylcellulose không có tác dụng dược lý. Natri carboxymethylcellulose có độ nhớt cao dẫn đến làm tăng thời gian lưu giữ trên mắt. Các tá dược trong Lubrina tương tự cấu tạo ion trong nước mắt.

Dược động học

Natri carboxymethylcellulose có trọng lượng phân tử cao (khoảng 90 000 dalton) do đó không thấm qua giác mạc.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10 ml

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, 15 ngày kể từ ngày mở nắp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất

CPC1HN

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

T3-19-050723-T03415-C00783