

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/6/14

194/8622

Kolon Global.

size : 105 x 26 mm

100

[Thành phần]: Mỗi viên nén có chứa: Chlorphenesin carbamate...125 mg [Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách sử dụng]: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng. [Dạng bào chế]: Viên nén [Bảo quản]: Bảo quản trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C Các thông tin khác xin xem tờ hướng dẫn sử dụng	Rx Thuốc bán theo đơn Lọ 100 Viên  Centrally Acting Muscle Relaxant MAORIX Tablet (Chlorphenesin Carbamate 125mg) Sản xuất bởi SINIL PHARM.CO.,LTD. San 5-1, Bonpyeong-ri, Angsung-myun, Chungju-si, Chungchongbuk-do, Hàn Quốc	ĐỌC KÍ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TẮM VỚI CỦA TRẺ EM [Tiêu chuẩn áp dụng]: Tiêu chuẩn nhà sản xuất Nhà nhập khẩu: SDK: Số lô: NSX: dd/mm/yy HD: dd/mm/yy KOLON GLOBAL CORP.
---	---	---

B. D. Ahn
Byung-Duk Ahn
President
B. D. Ahn

Rx- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

MAORIX TABLET

Thành phần:

Mỗi viên nén không bao chứa:

Hoạt chất: Chlorphenesin carbamate 125 mg

Tá dược: Lactose hydrate, Corn starch, Silicon dioxide, Magnesium stearate, Hydroxypropylcellulose, Sodium starch glycolate, Indigo carmine aluminium lake (blue no.2)

Dược động học:

Chlorphenesin carbamate hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn qua đường tiêu hóa.

Một phần rất nhỏ chlorphenesin carbamate chuyển hóa ở gan và bài tiết nhanh chóng qua đường tiểu, 85% liều dùng được bài tiết trong vòng 24 giờ.

Thời gian bán hủy: 2,5-5 giờ

Thời gian đạt đến nồng độ đỉnh: 1-3 giờ

Nồng độ đỉnh trong huyết tương: 3,8-17 mcg/ml.

Dược lực học:

Chlorphenesin carbamate là thuốc ức chế thần kinh trung ương, có tác dụng an thần và làm giãn cơ xương. Chưa được biết rõ cơ chế tác dụng của thuốc này. Thuốc không trực tiếp làm giãn cơ xương và không giống như loại thuốc phong bế thần kinh cơ, Chlorphenesin carbamate không làm giảm sự dẫn truyền nơ-rôn, không ảnh hưởng đến sự dẫn truyền thần kinh-cơ hoặc sự kích thích cơ. Trên động vật, chlorphenesin carbamate làm thay đổi cảm giác đau nguồn gốc trung ương, mà không làm mất phản xạ đau ngoại biên.

Chỉ định:

Dùng như một thuốc điều trị hỗ trợ các triệu chứng đau do co thắt kèm theo rối loạn cơ xương.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 2 viên mỗi lần x 3 lần mỗi ngày.

Liều có thể điều chỉnh tùy theo tuổi và mức độ trầm trọng của bệnh.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với thuốc hoặc các dẫn xuất của thuốc.

Bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan.

Không dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em

KOLON GLOBAL CORP.

B. D. Ahn
Byung-Duk Ahn

B. D. Ahn

Thận trọng:

Bệnh nhân có tiền sử rối loạn chức năng gan

Bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận

Bệnh nhân cần được cảnh báo thuốc có thể gây ảnh hưởng xấu đến khả năng làm các việc nguy hiểm đòi hỏi sự tập trung tinh thần như là vận hành máy móc hay tàu xe.

Độ an toàn khi sử dụng thời gian dài chưa được biết. Nên tiến hành các xét nghiệm lâm sàng (nước tiểu, máu, xét nghiệm chức năng gan) khi dùng thuốc kéo dài.

Tác dụng không mong muốn:

- Quá mẫn: Phát ban hoặc phù có thể xảy ra, ngưng dùng thuốc trong những trường hợp này.

- Hệ thần kinh trung ương: các phản ứng như chóng mặt, ngủ gà, nhức đầu, nặng đầu, hôn mê, mệt mỏi... có thể xảy ra. Cần thiết phải giảm liều hoặc ngưng dùng thuốc nếu các triệu chứng này xảy ra.

- Hệ tiêu hóa: buồn nôn, nôn mửa, đau dạ dày, khó chịu dạ dày, chướng bụng, chán ăn, khó tiêu có thể xảy ra.

- Huyết học: giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu có thể xảy ra tuy hiếm.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

Khi mang thai và thời kỳ cho con bú:

Độ an toàn và hiệu lực của thuốc trong thời gian mang thai và cho con bú chưa được thiết lập. Không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai, phụ nữ đang cho con bú ngoại trừ lợi ích của việc điều trị phải được đặt lên trên các nguy cơ có thể có của việc dùng thuốc.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc do thuốc có thể gây chóng mặt, ngủ gà, nhức đầu, nặng đầu, hôn mê, mệt mỏi

Tương tác thuốc:

Khi dùng đồng thời thuốc với những thuốc ức chế thần kinh trung ương khác kể cả rượu có thể làm tăng hoặc giảm tác động của chlorphenesin carbamate. Tốt hơn hết là nên ngưng dùng thuốc trong những trường hợp này. Nếu dùng thuốc này với những thuốc ức chế khác thì nên sử dụng thận trọng để tránh quá liều.

Quá liều:

Triệu chứng quá liều có thể bao gồm buồn ngủ nặng hoặc bất tỉnh.

Nếu nghi ngờ dùng quá liều, lập tức cấp cứu, trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đóng gói: Lọ 100 viên

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

Bảo quản: Bảo quản trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

KOLON GLOBAL CORP.

B. D. Ahn

Byung-Duk Ahn

B. D. Ahn

Để xa tầm với của trẻ em

Nhà sản xuất:

SINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Địa chỉ: San 5-1, Bonpyeong-ri, Angsung-myun, Chungju-si, Chungchongbuk-do, Hàn Quốc\

GLOBAL CORP.

D. Ahn

Syung-Duk Ahn

B D Ahn



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

1000

