



MARA VITA
Soft Capsule

 Springer

Sản xuất bởi
NEW GENE PHARM Inc. **KOMP**
649, Sukam-dong, Iksan-city, Jeonbuk, Korea

MARAVITA
Soft Capsule

Tocopherol acetat.....500,0mg
(tương đương với Vitamin E 500,0IU)
Magnesi oxyd.....250,0mg
(tương đương với Magnesi 150,8mg)

Chỉ định, liều dùng, cách dùng, lưu ý, tác dụng phụ, các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Dạng bài thi: Văn bản mìn

Bên cạnh: Tổng báo chí kinh tế

Sao quần: Trong Dao bị xim ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Đóng gói: 5 viên/hộp x 20 vỉ

Đường dùng: Đường uống

Nhập khẩu bởi:

See [officers and crew](#) for a full list of names.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

Công ty đồng nang

Su Heung Capsule Co., Ltd
317 Songnam-1-dong, Songnam-Gu Bucheon city
Kyungki-do, Korea

Visa No./SPK:
Lot No./Seri No. SX:
Mfg. date (S):
Exp. date/HSD:

Exp. 0.0007135

10

81

15

QUI PR

đá

án

CHL



MARAVITA

Soft Capsule

5 Softcaps/Blister x 20 Blisters/Box



Manufactured by
NEW GENE PHARM Inc.
649, Sukam-dong, Iksan-city, Jeonbuk, Korea



MARAVITA
Soft Capsule

[Composition]
Each soft capsule contains:
Tocopherols acetate ————— 500mg
(as 500 IU of Vitamin E)
Magnesium oxide ————— 250mg
(as 150.8mg of Magnesium)

[Indications]
Please see the insert inside

[Dosage & Administration]
Please see the insert inside

[Precautions & Contra-indications]
Please see the insert inside

[Storage]
Store in a cool & dry place below 30°C.
Protect from light & moisture

[Specification] in house
[Shelf life] 36 months from the date of
manufacturing

Encapsulation by:
Su Heung Capsule Co., Ltd
317 Songnae-1-dong, Sosa-Gu Bucheon city,
Kyunggi-do, Korea

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
AND READ THE ACCOMPANYING
INSTRUCTIONS BEFORE USE**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

MARAVITA

Thành phần] Mỗi viên nang mềm có chứa

Tocopherol acetate.....500mg

(tương đương với Vitamin E 500IU)

Magnesium oxide.....250mg

(tương đương với Magnesi 150,8mg)

Tá dược: Dầu đậu nành, sáp ong trắng, lecithin, gelatin, glycerin đậm đặc, dung dịch D-sorbitol, ethylvanillin, sắt oxit, sáp carnauba, dầu cọ

[Dược lực học]

Magnesi đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Tình trạng thiếu Magnesi có thể là một phần nguyên nhân của những căn bệnh như: Cao huyết áp, hen suyễn, đau nửa đầu, chuột rút.

Vitamin E rất cần thiết cho cơ thể bởi nó ngăn cản sự oxy hóa các thành phần thiết yếu trong tế bào của cơ thể, ngăn cản tạo thành các sản phẩm oxy hóa có hại. Vitamin E phản ứng với các gốc tự do làm giảm các tác nhân oxy hóa lên các màng tế bào.

[Dược động học]

Sự hấp thu vitamin E từ đường tiêu hóa nhờ tác động của dịch mật và dịch tụy. Thuốc vào máu qua vi thể dưỡng chấp trong bạch huyết. Rồi được phân bố rộng rãi vào tất cả các mô và tích lại ở mô mỡ. Hầu hết liều dùng được thải trừ qua mật, chỉ lượng nhỏ vitamin E được chuyển hóa ở gan thành các glucuronid và γ -lacton của acid tocopheronic, rồi thải qua nước tiểu. Vitamin E vào sữa nhưng rất ít qua nhau thai.

Magnesium oxide tác dụng với acid dạ dày tạo muối Magnesi clorid và nước. Khoảng 15-30% lượng magnesi clorid vừa tạo thành được hấp thu và sau đó được thải trừ qua nước tiểu.

[Chỉ định]

Điều trị tình trạng thiếu vitamin E

Bổ sung khoáng chất thiết yếu trong trường hợp hoạt động thể lực quá mức

[Liều lượng và cách dùng]

Người lớn và trẻ trên 18 tuổi: 1 -2 viên/ngày.

Có thể tăng hoặc giảm liều tùy theo độ tuổi và triệu chứng.

[Lưu ý]

Magnesium oxide tác dụng với acid dạ dày tạo ra muối magnesi clorid có tác dụng nhuận tràng, do đó khi dùng liều cao thuốc có thể gây tiêu chảy.

Ở bệnh nhân suy thận nặng, dùng thuốc có thể làm tăng Mg^{++} huyết gây hạ huyết áp, hôn mê

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Do hiệu lực và độ an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú chưa được công bố, vì vậy không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thận trọng khi dùng cho người lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thể gây đau đầu, hoa mắt, mệt mỏi

[Chống chỉ định]

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân suy thận, trẻ nhỏ (đặc biệt ở trẻ mất nước hoặc suy giảm chức năng thận) do nguy cơ tăng maginesi huyết.

Phụ nữ mang thai và cho con bú.

[Tác dụng phụ]

Các tác dụng ngoài ý đã được báo cáo: Đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, quặn ruột, mệt mỏi, rối loạn cảm xúc, viêm tĩnh mạch huyết khối, đau đầu, hoa mắt, hạ huyết áp, phát ban, rối loạn hóc môn sinh dục, đau vú, tăng creatine-kinase huyết, tăng thyroxin và tri-iodotyronin huyết thanh

Xin thông báo cho bác sỹ các tác dụng ngoại ý gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc.

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

[Trương tác thuốc]

Vitamin E đối kháng với tác dụng của vitamin K, nên làm tăng thời gian đông máu. Nồng độ vitamin E thấp ở người bị kém hấp thu do thuốc (như kém hấp thu khi dùng cholestyramin).

Do Magnesium oxide còn có tác dụng giảm acid dạ dày, do đó có thể làm giảm hoặc tăng tác dụng của các thuốc mà mức độ hấp thu phụ thuộc và acid dạ dày.

[Quá liều]

Khi dùng quá liều, có thể gây ra tiêu chảy, hạ huyết áp do tác dụng của muối Magnesi. Không có các biện pháp giải độc đặc hiệu, sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ

[Đường dùng]: Đường uống

[Dạng bào chế]: Viên nang mềm

[Đóng gói] Hộp 20 vỉ x 5 viên

[Hạn dùng]

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

[Bảo quản] Bảo quản trong bao bì kín, ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

[Tiêu chuẩn] Nhà sản xuất

Nhà sản xuất

New Gene Pharm. Inc.

649, Sukam -dong, Iksan-city, Jeonbuk, Korea

Công ty đóng nang

Su Heung Capsule Co., Ltd

317 Songnae-1-dong, Sosa-Gu Bucheon city, Kyunggido, Korea



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



NEW GENE PHARM INC.

649, Sukam-Dong Iksan
Jeonbuk, Korea

*M. Gi
Moon Gi*

Joo Hwan Yang

Su Heung Capsule Co.

317. Songnae - 1 - dong. Sosa - gu
Bucheon city. Kyungni - do. Korea

