

# MẪU NHÃN MEDICLEYE CHAI 2,5 ml

THUỐC NHỎ MẮT

**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Thành phần:  
Diclofenac natri .....2,5 mg  
Tá dược vừa đủ .....2,5 ml.

Chỉ định, liều dùng - cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Không sử dụng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu.

SBK/Reg No.:  
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhà phân phối: Công ty cổ phần Global Pharmaceutical  
Địa chỉ: Số 5 Đường 59B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 1 lọ  
**2,5 ml**

THUỐC NHỎ MẮT

**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Composition:  
Diclofenac sodium.....2,5 mg  
Excipients .....q.s for 2,5 ml.

Indications, dosage - usage, contraindications and other information: Please read the package insert.

Storage: In dry place, temperature below 30°C, protect from light.

Do not use more than 15 days after first opening.

Specification: Inhouse standard.

Manufacturer: Medipharco Pharmaceutical Joint Stock Company  
Address: 08 Nguyen Truong To, Phuoc Vinh Ward, Hue city.

Distributor: Global Pharmaceutical Joint Stock Company  
Address: No 05, 59B Street, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PLEASE READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USING.

Box of 1 bottle  
**2.5 ml**

EYE DROPS

**MEDICLEYE**  
Diclofenac sodium 0,1%

MPC MEDIPHARCO

MPC MEDIPHARCO

Số lô SX/Batch.No:  
Ngày SX/Mfg.date:  
HĐ/Exp.date:

Lọ 2,5 ml THUỐC NHỎ MẮT

**MEDICLEYE**

Thành phần:  
Diclofenac natri.....2,5 mg  
Tá dược .....vừa đủ 2,5 ml.

Nhà sản xuất:  
Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh  
Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  
Số lô SX và Hạn dùng được in trên lọ

Ngày 25 tháng 01 năm 2024  
Người phê duyệt



Nguyễn Văn Vàng

# MẪU NHÃN MEDICLEYE CHAI 5 ml

THUỐC NHỎ MẮT

**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Thành phần:  
Diclofenac natri .....5 mg  
Tá dược vừa đủ .....5 ml.

Chỉ định, liều dùng - cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Không sử dụng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu.

SĐK/Reg No.:  
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vinh, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhà phân phối: Công ty cổ phần Global Pharmaceutical  
Địa chỉ: Số 5 Đường 59B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Hộp 1 lọ  
**5 ml**

THUỐC NHỎ MẮT

**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Composition:  
Diclofenac sodium.....5 mg  
Excipients .....q.s for 5 ml.

Indications, dosage - usage, contraindications and other information: Please read the package insert.

Storage: In dry place, temperature below 30°C, protect from light.

Do not use more than 15 days after first opening.

Specification: Inhouse standard.

Manufacturer: Medipharco Pharmaceutical Joint Stock Company  
Address: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phước Vinh Ward, Hue city.

Distributor: Global Pharmaceutical Joint Stock Company  
Address: No 05, 59B Street, Tân Tạo Ward, Bình Tân District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PLEASE READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USING.

Box of 1 bottle  
**5 ml**

EYE DROPS

**MEDICLEYE**  
Diclofenac sodium 0.1%

MPC

MEDIPHARCO

MPC

MEDIPHARCO

Số lô SX/Batch.No:  
Ngày SX/Mfg.date :  
HDI/Exp.date:

Lọ 5 ml

THUỐC NHỎ MẮT


**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Thành phần:  
Diclofenac natri.....5 mg  
Tá dược.....vừa đủ 5 ml.

Nhà sản xuất:  
Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vinh  
Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số lô SX và Hạn dùng được in trên lọ

Ngày 25 tháng 01 năm 2024  
Người phê duyệt



Nguyễn Văn Vàng

# MẪU NHÃN MEDICLEYE CHAI 6 ml

THUỐC NHỎ MẮT  
**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Thành phần:  
Diclofenac natri .....6 mg  
Tà được vừa đủ .....6 ml.

Chỉ định, liều dùng - cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Không sử dụng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu.

SĐK/Reg No.:  
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhà phân phối: Công ty cổ phần Global Pharmaceutical  
Địa chỉ: Số 5 Đường 59B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Hộp 1 lọ  
**6 ml**

THUỐC NHỎ MẮT  
**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Composition:  
Diclofenac sodium.....6 mg  
Excipients .....q.s for 6 ml.

Indications, dosage - usage, contraindications and other information: Please read the package insert.

Storage: In dry place, temperature below 30°C, protect from light.

Do not use more than 15 days after first opening.

Specification: Inhouse standard.

Manufacturer: Medipharco Pharmaceutical Joint Stock Company  
Address: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phước Vĩnh Ward, Hue city.

Distributor: Global Pharmaceutical Joint Stock Company  
Address: No. 05, 59B Street, Tân Tạo Ward, Bình Tân District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PLEASE READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USING.

Box of 1 bottle  
**6 ml**

EYE DROPS  
**MEDICLEYE**  
Diclofenac sodium 0,1%

MPC MEDIPHARCO

Số lô SX/Batch.No:  
Ngày SX/Mfg.date :  
HĐ/Exp.date:

Lọ 6 ml THUỐC NHỎ MẮT  
**MEDICLEYE**  
Diclofenac natri 0,1%

Thành phần:  
Diclofenac natri .....6 mg  
Tà được .....vừa đủ 6 ml.  
Nhà sản xuất:  
Công ty cổ phần Dược Medipharco  
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh  
Tp Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  
Số lô SX và Hạn dùng được in trên lọ

Ngày 25 tháng 01 năm 2024  
Người phê duyệt



Nguyễn Văn Vàng

Thuốc nhỏ mắt



## MEDICLEYE

Để xa tầm tay của trẻ em.

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

**Thành phần công thức thuốc:** Mỗi lọ thuốc 2,5 ml có chứa:

-Thành phần dược chất: Diclofenac natri.....2,5 mg

-Thành phần tá dược:

Tromethamin, acid boric, polyoxyl castor oil, thimerosal, nước cất vừa đủ.....2,5ml.

**Dạng bào chế:** Dung dịch trong suốt đến ngà vàng, đựng trong chai PE sạch, kín.

### Chỉ định:

- Ngăn chặn tình trạng co đồng tử trong phẫu thuật đục thủy tinh thể.
- Điều trị tình trạng đau mắt, sưng và viêm sau phẫu thuật đục thủy tinh thể.
- Chống viêm trong các bệnh lý ở phần trước nhãn cầu nhưng không do nhiễm trùng (như trong viêm kết mạc mạn tính không nhiễm trùng); viêm sau chấn thương (kết hợp với điều trị kháng sinh tại chỗ).
- Kiểm soát tình trạng đau mắt và khó chịu liên quan đến khuyết tật biểu mô giác mạc sau phẫu thuật PRK hoặc chấn thương không xâm nhập do tai nạn.
- Kiểm soát tình trạng viêm sau khi điều trị với phương pháp Argon laser trabeculoplasty (ALT).
- Làm giảm các triệu chứng ở mắt của bệnh Viêm kết mạc dị ứng theo mùa (SAC).
- Điều trị viêm và tình trạng khó chịu sau phẫu thuật điều trị lác mắt.
- Thuốc nhỏ mắt Diclofenac cũng được sử dụng để tạm thời giảm đau mắt và nhạy cảm với ánh sáng ở những bệnh nhân đang hồi phục sau phẫu thuật khúc xạ giác mạc

### Liều dùng và cách dùng,:

Dung dịch nhỏ mắt Medicleye chỉ dùng để nhỏ thuốc vào túi kết mạc, không nên nhỏ trực tiếp vào khoang phía trước của mắt. Liều dùng như sau:

#### Người lớn:

Dự phòng ngăn chặn tình trạng co đồng tử trong phẫu thuật đục thủy tinh thể	Nhỏ 1 giọt, có thể dùng đến 4 lần trong 2 giờ trước phẫu thuật.
Kiểm soát viêm sau phẫu thuật	Nhỏ 1 giọt, 4 lần mỗi ngày, dùng trong 28 ngày
Kiểm soát tình trạng đau mắt liên quan đến khuyết tật biểu mô giác mạc sau chấn thương	Nhỏ 1 giọt, 4 lần mỗi ngày, dùng trong 2 ngày.

không xâm nhập do tai nạn	
Kiểm soát tình trạng đau và khó chịu ở mắt sau phẫu thuật PRK	Nhỏ 1 giọt, 2 lần trong 1 giờ trước phẫu thuật, nhỏ 1 giọt 2 lần cách nhau 5 phút ngay sau khi phẫu thuật PRK, sau đó nhỏ 1 giọt cách 2-5 giờ trong 24 giờ.
Kiểm soát tình trạng viêm sau khi điều trị với phương pháp ALT	Nhỏ 1 giọt, 4 lần trong 2 giờ trước phẫu thuật ALT, sau đó nhỏ 1 giọt 4 lần mỗi ngày, dùng trong 7 ngày.
Giảm các triệu chứng ở mắt của bệnh Viêm kết mạc dị ứng theo mùa (SAC)	Nhỏ 1 giọt, 4 lần mỗi ngày.

Các chỉ định khác: 1 giọt x 4 – 5 lần / ngày.

- Để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi, cần sử dụng Medicleye ở liều hàng ngày thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể (xem phần Cảnh báo và thận trọng).

*Chú ý giữ không để nhiễm trùng đầu chai thuốc, sau khi nhỏ thuốc nhắm mắt/chẹn ống lệ mũi 5 phút để giảm tác dụng ngoại ý, tác dụng toàn thân.*

*Sử dụng cho trẻ em:* Thuốc nhỏ mắt có chứa Diclofenac natri không được chỉ định sử dụng ở trẻ em. Các nghiên cứu về sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa Diclofenac natri ở trẻ em chỉ hạn chế trong 1 vài nghiên cứu lâm sàng trong phẫu thuật điều trị lác mắt được công bố.

#### **Chống chỉ định:**

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Giống như các thuốc chống viêm không steroid khác, Diclofenac natri cũng chống chỉ định ở những bệnh nhân bị hen suyễn, nổi mề đay hoặc viêm mũi cấp tính do acetylsalicylic acid hoặc bởi các thuốc khác ức chế men tổng hợp Prostaglandin.
- Người mang kính áp tròng.
- Bệnh nhân suy tim sung huyết (từ độ II đến độ IV theo phân độ chức năng của suy tim theo Hội Tim New York-NYHA), bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh động mạch vành ngoại vi, bệnh mạch máu não.

#### **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:**

- Tác dụng chống viêm của thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) có thể che dấu sự khởi phát và / hoặc tiến triển của nhiễm trùng mắt. Khi có nhiễm trùng hoặc nếu có nguy cơ nhiễm trùng, nên điều trị với kháng sinh thích hợp.
- Mặc dù chưa có các báo cáo về tác dụng phụ, có khả năng về mặt lý thuyết là bệnh nhân dùng các loại thuốc khác vẫn có nguy cơ bị kéo dài thời gian chảy máu, hoặc các khuyết tật cầm máu có thể bị trầm trọng hơn khi dùng với Medicleye.

- Cần thận trọng khi sử dụng đồng thời NSAID như diclofenac đồng thời với steroid tại chỗ (xem mục Tương tác thuốc).

- Sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt, bít mũi lại hoặc nhắm mắt trong 3 phút để giảm sự hấp thu thuốc vào toàn thân, có thể dẫn đến giảm tác dụng phụ toàn thân và tăng tác động tại chỗ.

**- Nguy cơ huyết khối tim mạch:**

Các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), không phải aspirin, dùng đường toàn thân, có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tim mạch, bao gồm cả nhồi máu cơ tim và đột quy, có thể dẫn đến tử vong. Nguy cơ này có thể xuất hiện sớm trong vài tuần đầu dùng thuốc và có thể tăng lên theo thời gian dùng thuốc. Nguy cơ huyết khối tim mạch được ghi nhận chủ yếu ở liều cao.

Bác sĩ cần đánh giá định kỳ sự xuất hiện của các biến cố tim mạch, ngay cả khi bệnh nhân không có các triệu chứng tim mạch trước đó. Bệnh nhân cần được cảnh báo về các triệu chứng của biến cố tim mạch nghiêm trọng và cần thăm khám bác sĩ ngay khi xuất hiện các triệu chứng này.

Để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện các biến cố bất lợi, cần sử dụng ở liều hàng ngày thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể.

Cần cân nhắc cẩn thận khi sử dụng diclofenac cho bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch rõ rệt (như tăng huyết áp, tăng lipid huyết thanh, đái tháo đường, nghiện thuốc lá).

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

**-Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:**

Chưa có dữ liệu về việc sử dụng thuốc nhỏ mắt Medicleye trong thai kỳ. Các nghiên cứu trên động vật với diclofenac đã cho thấy độc tính trên sinh sản.

Trong giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng giữa: Các nghiên cứu trên động vật cho đến nay cho thấy không có rủi ro cho thai nhi nhưng không có nghiên cứu trên phụ nữ mang thai.

Trong 3 tháng cuối thai kỳ: Không nên dùng thuốc, do, nguy cơ ức chế tử cung co bóp, nguy cơ làm đóng ống động mạch sớm, gây tăng áp lực tiểu tuần hoàn không hồi phục, suy thận ở thai.

**-Sử dụng thuốc ở phụ nữ cho con bú:**

Diclofenac được bài tiết vào sữa mẹ. Chưa có dữ liệu về tác dụng trên trẻ bú mẹ. Sử dụng diclofenac ở mắt không được khuyến cáo trong thời gian cho con bú trừ khi những lợi ích mong đợi lớn hơn những rủi ro có thể xảy ra.

**Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Thuốc có thể gây nhòe mắt, nhìn mờ tạm thời hoặc rối loạn thị giác do vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc. Bệnh nhân dùng thuốc nên hạn chế lái xe hoặc vận hành máy móc.

31  
CÔNG  
CỔ PH  
CLOB  
MACE  
57 HỒ

### **Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

#### *\*Tương tác của thuốc:*

Sử dụng đồng thời các NSAID tại chỗ như diclofenac và steroid tại chỗ ở những bệnh nhân bị viêm giác mạc trước đó có thể làm tăng nguy cơ biến chứng với giác mạc, do đó nên thận trọng khi sử dụng.

Để tránh các hoạt chất bị rửa trôi khi sử dụng đồng thời với thuốc nhãn khoa khác, nên sử dụng cách nhau khoảng 5 phút.

*\*Tương kỵ của thuốc:* Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

### **Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

- Rất thường xuyên: Đau mắt.
- Các phản ứng bất lợi thường được quan sát là: kích ứng mắt thoáng qua, nhẹ đến trung bình.
- Các phản ứng ít được quan sát khác là ngứa mắt, tăng nhãn áp và mờ mắt ngay sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt.
- Viêm giác mạc hoặc rối loạn giác mạc đã được quan sát, thường là sau khi dùng thuốc thường xuyên.
- Ở những bệnh nhân có nguy cơ rối loạn giác mạc như đang trong quá trình sử dụng corticosteroid hoặc đồng thời mắc các bệnh như nhiễm trùng hoặc viêm khớp dạng thấp, dùng kết hợp với diclofenac, trong 1 vài trường hợp hiếm gặp, nguy cơ viêm giác mạc loét, mỏng giác mạc, viêm giác mạc, khuyết tật biểu mô giác mạc và phù giác mạc, có thể gây hại cho thị giác. Hầu hết bệnh nhân được điều trị trong thời gian dài.
- Tình trạng dị ứng với các phản ứng ở mắt đã được báo cáo như: sung huyết kết mạc, viêm kết mạc dị ứng, ban đỏ mí mắt, phù, ngứa, và các phản ứng quá mẫn toàn thân như nổi mề đay, phát ban, chàm, ban đỏ.
- Nguy cơ huyết khối tim mạch: Các thử nghiệm lâm sàng và dịch tễ dược học cho thấy việc sử dụng diclofenac có liên quan đến tăng nguy cơ xuất hiện biến cố huyết khối tim mạch (như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ), đặc biệt khi sử dụng diclofenac ở liều cao và kéo dài (xem thêm phần Cảnh báo và thận trọng)
- Trong một số ít trường hợp, khó thở và bệnh hen suyễn nặng lên, đã được báo cáo.

*Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.*

### **Quá liều và cách xử trí:**

Việc uống nhầm **MEDICLEYE** không gây tác dụng phụ gì, vì một lọ thuốc nhỏ mắt 2,5 ml chỉ chứa 2,5 mg diclofenac natri, lượng này tương đương khoảng 1,5% liều uống tối đa dùng cho người lớn.

**Đặc tính dược lực học:**

Mã ATC: S01BC03

Nhóm dược lý: Thuốc chống viêm không steroid.

Medicleye chứa diclofenac natri, hợp chất non-steroid có tác dụng kháng viêm và giảm đau. Cơ chế tác dụng của diclofenac đã được chứng minh qua thực nghiệm là ức chế sự tổng hợp prostaglandin. Prostaglandin có vai trò như một chất trung gian hóa học của quá trình viêm và đau

- Khi được dùng trước phẫu thuật lấy thủy tinh thể đục, thuốc nhỏ mắt có chứa diclofenac natri 0.1% ngăn chặn sự co đồng tử xảy ra trong lúc phẫu thuật.
- Thuốc có tác dụng kháng viêm khi được dùng sau phẫu thuật hoặc chấn thương mắt hoặc các tình trạng viêm không do nhiễm trùng khác của mắt.
- Khi dùng với mục đích dự phòng cho bệnh nhân mổ lấy thủy tinh thể đục và đặt kính nội nhãn, thuốc nhỏ mắt chứa diclofenac natri 0.1% làm giảm tần suất và độ nặng (nếu có xảy ra) của phù hoàng điểm dạng nang.
- Giảm viêm mắt và khó chịu hiệu quả hơn so với steroid tại chỗ sau phẫu thuật điều trị lác mắt, tránh được các tác dụng phụ của steroid như làm chậm lành vết thương kết mạc và tăng áp lực nội nhãn.
- Giảm viêm mắt, giảm đau và khó chịu (chứng sợ ánh sáng, nóng rát / đau nhói, cảm giác có dị vật trong mắt, đau mắt và ngứa)
- Khi nhỏ mắt, liều dùng hiệu quả mỗi ngày chỉ vào khoảng 0,25-0,5 mg (1 giọt x 3-5 lần/ngày).

**Đặc tính dược động học:**

Thực nghiệm trên thỏ khỏe mạnh cho thấy diclofenac (đánh dấu bằng <sup>14</sup>C) đạt nồng độ tối đa trong giác mạc và kết mạc vào thời điểm 30 phút sau khi nhỏ. Lượng thuốc lớn nhất được tìm thấy trong 2 mô này và trong màng đệm và võng mạc. Thuốc được thải trừ nhanh và hoàn toàn ra khỏi cơ thể sau 6 giờ.

Ở người, khả năng ngấm vào tiền phòng của diclofenac đã được xác nhận. Không phát hiện thấy diclofenac trong huyết thanh người sau khi nhỏ diclofenac sodium 0,1% vào mắt.

**Quy cách đóng gói:** Lọ 2,5 ml, lọ 5,0 ml, 6,0 ml. Hộp 1 lọ, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

**Điều kiện bảo quản:** Để nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu.

Số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì chính của sản phẩm.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** Tiêu chuẩn cơ sở.

**Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Medipharco.**

Địa chỉ: số 8 Nguyễn Trường Tộ, P Phước Vĩnh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

**Nhà phân phối: Công ty cổ phần Global Pharmaceutical**

Địa chỉ: Số 5 đường 59B, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngày 25 tháng 01 năm 2024

**Tổng Giám Đốc**



*Nguyễn Văn Vàng*