
https://trungtamthuoc.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH

1. MẪU NHÃN HỘP:



MẪU NHÃN CHAI:



https://trungtamthuoc.com/

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MEDIMAX - F

1. **Tên thuốc**
   MEDIMAX - F
2. **Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc**
   Để xa tầm tay trẻ em
   Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
   Thuốc xịt mũi
3. **Thành phần công thức thuốc :**
   Mỗi 1 chai 15 ml chứa :
   Thành phần dược chất
   Xylometazolin hydroclorid 15 mg
   Thành phần tá dược : Acid boric, Natri borat, Tween 20, EDTA, Benzalkonium chlorid, Nước tinh khiết
4. **Dạng bào chế :** Thuốc xịt mũi
   Dung dịch trong, không màu
5. **Chỉ định :**
   Thuốc có tác dụng tản huyết và chống xung huyết mũi.
   Hỗ trợ điều trị trong trường hợp viêm mũi, viêm xoang.
   Lưu ý : Không dùng thuốc quá 3 ngày
6. **Cách dùng - Liều dùng**
   Để lọ thuốc ở vị trí đứng thẳng, nắp ở phía trên, lắc lọ thuốc vài lần. Cho đầu lọ vào mũi và bấm nhanh, mạnh vào nút bấm ở phía trên, rút đầu lọ ra trước khi thả tay bấm.
   Mỗi lần xịt một lần vào trong mỗi bên mũi
   Mỗi ngày xịt 2 – 3 lần. Không xịt quá 4 lần / ngày.
   Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc
7. **Chống chỉ định**
   Mẫn cảm với thuốc.
   Đang dùng IMAO.
   Người bị bệnh glôcôm góc đóng.
   Người có tiền sử mẫn cảm với các thuốc adrenergic.
   Người đang dùng các thuốc chống trầm cảm 3 vòng.
   Trẻ em dưới 12 tuổi
8. **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**
   Thận trọng khi dùng cho những người bị cường giáp, bệnh tim, tăng huyết áp, xơ cứng động mạch, phì đại tuyến tiền liệt hoặc đái tháo đường, người đang dùng các chất ức chế monoaminooxydase.
   Chỉ dùng các chế phẩm Xylometazolin cho trẻ em khi có chỉ định và theo dõi của thầy thuốc.
   Không nên dùng nhiều lần và liên tục để tránh xung huyết trở lại.
9. **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú**
   Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

https://trungtamthuoc.com/

10. **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc**
Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc

Sử dụng các thuốc giống giao cảm nói chung cũng như Naphazolin cho người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoaminooxydase, maprotilin hoặc các thuốc chống trầm cảm ba vòng có thể gây phản ứng tăng huyết áp nặng.

12. **Tác dụng không mong muốn**
Phản ứng phụ nghiêm trọng ít xảy ra khi dùng tại chỗ Xylometazolin ở liều điều trị. Một số phản ứng phụ thường gặp nhưng thoáng qua như kích ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, khô niêm mạc mũi, phản ứng xung huyết trở lại có thể xảy ra khi dùng dài ngày. Một số phản ứng toàn thân xảy ra do thuốc nhỏ mũi thấm xuống họng gây nên tăng huyết áp, tim đập nhanh, loạn nhịp.
Thường gặp, ADR > 1/100
Kích ứng tại chỗ
Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100
Cảm giác bỏng, rát, khô hoặc loét niêm mạc, hắt hơi, xung huyết trở lại với biểu hiện đỏ, sưng và viêm mũi khi dùng thường xuyên, dài ngày.
Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, đánh trống ngực, mạch chậm và loạn nhịp.
"Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc"

13. Quá liều và cách xử trí

Khi dùng quá liều hoặc kéo dài hoặc quá thường xuyên có thể bị kích ứng niêm mạc mũi, phản ứng toàn thân, đặc biệt ở trẻ em. Quá liều ở trẻ em, chủ yếu gây ức chế thần kinh trung ương, sốc như hạ huyết áp, hạ nhiệt, mạch nhanh, ra mồ hôi, hôn mê.
Xử trí chủ yếu là điều trị triệu chứng.

14. **Quy cách đóng gói :** Hộp 1 chai x 15 ml
15. **Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc**
15.1. Điều kiện bảo quản : Nơi khô mát (dưới 30^0C), tránh ánh sáng.
15.2. Hạn dùng : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
15.3. Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS
16. **Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
4A Lò Lu – Phường Trường Thạnh – Q9 – TP.HCM.
ĐT: 028.37300167 – Fax: 028.37301103
Email : qmmediphar03@gmail.com - Web : WWW. Qmmediphar.com