





NHÃN HỘP VÀ GÓI MEDISMETIT



21/1/15

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sĩ

Dạng bào chế: Thuốc bột uống

MEDISMETIT

Trình bày: Hộp 20 gói x 4 g.

Công thức: Mỗi gói chứa:

Diocetahedral smectit: 3000 mg

Tá dược: vđ gói.

(Dextrose monohydrat, Đường Aspartam, Vanilin).

Dược lực học:

– Diocetahedral smectit có cấu trúc từng lớp và độ nhầy cao, nó có khả năng bao phủ niêm mạc tiêu hóa, tương tác với các glycoprotein của chất nhầy dính trên niêm mạc bảo vệ khỏi các tác nhân tấn công.

– Nhờ khả năng tác động trên hàng rào niêm mạc tiêu hóa và khả năng bám dính cao nên bảo vệ niêm mạc tiêu hóa. Thuốc không làm ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển sinh lý của ruột.

Dược động học:

– Diocetahedral smectit không được hấp thu qua đường tiêu hóa và thải trừ qua phân.

Chỉ định:

- Điều trị triệu chứng đau của bệnh thực quản-dạ dày-tá tràng và đại tràng.
- Tiêu chảy trong hội chứng ruột kích thích.

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với thành phần thuốc. Tắc ruột.
- Không dùng chữa ỉa chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

Liều dùng và cách dùng: Dùng uống

Liều dùng:

- Người lớn: Liều thường dùng là 3 gói mỗi ngày, chia 2-3 lần uống.
- Trẻ em trên 2 tuổi: 2-3 gói mỗi ngày, chia 2-3 lần uống.
- Trẻ em từ 1-2 tuổi: 1-2 gói mỗi ngày, chia 2-3 lần uống.
- Trẻ em dưới 1 tuổi: 1 gói mỗi ngày, chia 2-3 lần uống.

Trường hợp tiêu chảy cấp có thể dùng liều gấp đôi lúc bắt đầu điều trị.

Cách dùng:

- Hòa trong nửa ly nước ấm, khuấy kỹ trước khi uống.
- Trường hợp viêm ruột, hội chứng ruột kích thích nên uống ngay trước khi các bữa ăn, trường hợp bệnh ở dạ dày- thực quản thì uống sau các bữa ăn.
- Trường hợp trẻ em có thể pha trong bình với 50 ml nước dùng dần trong ngày hoặc hòa với các chất lỏng hay bán lỏng như canh, nước ép trái cây hoặc rau tán nhuyễn, thực phẩm trẻ em.



Hoặc dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Tương tác thuốc :

- Tính chất hấp phụ của Dioctahedral smectit có thể thay đổi thời gian và (hoặc) sự hấp thu của thuốc khác, do đó nên uống cách khoảng với Dioctahedral smectit.
- Uống cách xa thuốc khác ít nhất 2 giờ.

Thận trọng:

- Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày.
- Nếu ỉa chảy mất nước cần bù nước kết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc tiêm truyền dịch tĩnh mạch, số lượng nước cần bù tùy theo tuổi, cơ địa người bệnh và mức độ bị tiêu chảy. Cần thận trọng khi dùng Dioctahedral smectit để điều trị ỉa chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn tiếp tục trong ỉa chảy cấp.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Không có chống chỉ định với phụ nữ trong thời kì mang thai và cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe:

Không có ảnh hưởng gì.

Quá liều và xử trí:

- *Triệu chứng:* dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc ỉa chảy.
- *Xử trí:* cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

Tác dụng không mong muốn :

Có thể gây ra hoặc làm tăng táo bón nhưng rất hiếm, điều trị vẫn có thể tiếp tục với liều lượng giảm.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-014-2012

Logo công ty: **MEDISUN**

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: Số 521, Ấp An Lợi, X. Hoà Lợi, H. Bến Cát, T. Bình Dương.



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

Bình Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2014

Giám đốc cơ sở đăng ký thuốc



ĐS. Lê Minh Hoàn