

Lần đầu: 12/6/2010

35/145 1/2



* Nhãn trên hộp 1 tuýp x 10 g: (góp ý lần 1)



MedSkinBETA

Betamethason 0,1%

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Thoa một lớp mỏng lên vùng da cần điều trị 2 - 3 lần/ngày.

Thành phần của thuốc: Lactat của betamethason, các corticosteroid khác hoặc với bất kỳ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Da mẫn với betamethason, các corticosteroid khác hoặc với bất kỳ

công bị, viêm da do

chứng Stevens - Johnson), viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, bệnh xeroderma

phóng xạ, phồng rộp da do bỏng nắng, vảy nến, mụn, ban đỏ da dạng (nổi

khẩn, phát ban của bệnh bạch huyết cấp, các bệnh khác: tổn thương thâm nhiễm

CHỈ ĐỊNH: MedSkin BETA được chỉ định trong các trường hợp: tổn thương thâm nhiễm

MedSkinBETA

Betamethason 0,1%

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Dũ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 • Fax: (0710) 3895209

www.dhgpharma.com.vn

Rx

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

MedSkinBETA

Betamethason 0,1%

Hộp 1 tuýp x 10 g kem bôi da

DHG PHARMA

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc khi dùng.

Điều kiện bảo quản: nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

SDK (Reg. No.):

Ngày SX (Mfg. date):

Số lô SX (Batch No.):

HD (Exp. date):

Handwritten signature.

* **Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc:** (Góp ý lần 1)



MedSkin BETA
Betamethason 0,1%

CÔNG THỨC:

Betamethason valerat 12 mg

Tá dược vừa đủ 10 g

(Isopropyl palmitat, dầu parafin, sepineo P600, propylen glycol, cetyl stearyl alcohol, EDTA sodium, nipagin, tween 20, PEG 400, nước tinh khiết).

DẠNG BẢO CHẾ: Kem bôi da.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp x 10 g.

DƯỢC LỰC HỌC: Betamethason valerat là một corticosteroid tổng hợp, có tác dụng chống viêm và chống dị ứng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Betamethason dễ được hấp thụ khi dùng tại chỗ. Đặc biệt khi bôi, nếu băng kín hoặc khi da có vết thương hở, có thể có một lượng betamethason được hấp thu đủ cho tác dụng toàn thân.

CHỈ ĐỊNH: MedSkin BETA được chỉ định trong các trường hợp: tổn thương thâm nhiễm khu trú, phì đại của lichen phẳng, vảy nến, lupus ban dạng đĩa, ban đỏ đa dạng (hội chứng Stevens - Johnson), viêm da tróc vảy, viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, bệnh xơ cứng bì, viêm da cơ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với betamethason, các corticosteroid khác hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Lao da, nhiễm trùng da, nấm da.

THẬN TRỌNG: Tránh thoa lên mắt.

Khi điều trị có băng kín, trên vùng nếp gấp da, diện tích da rộng thuốc có thể được hấp thu toàn thân với một lượng đủ để gây nên các biểu hiện của tình trạng cường vỏ thượng thận. Tác dụng này dễ xảy ra hơn ở trẻ nhũ nhi và trẻ em.

PHỤ NỮ MANG THAI HOẶC ĐANG CHO CON BÚ:

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên thoa cùng lúc với thuốc bôi da khác trên cùng vùng da.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Cũng như các corticoid khác, khi điều trị kéo dài với liều cao có thể gây teo da tại chỗ như các vết nứt da, mỏng da, giãn các mạch máu bề mặt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Tình trạng quá liều cấp tính rất ít khi xảy ra, tuy nhiên, trong trường hợp quá liều mãn tính hoặc sử dụng sai, các biểu hiện cường vỏ thượng thận có thể xảy ra và trong trường hợp này cần phải ngưng ngay thuốc corticoid bôi da.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Thoa một lớp mỏng lên vùng da cần điều trị 2 - 3 lần/ngày.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Tư Vấn Khách Hàng
0710.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
Q. NINH KIỀU - TP. CẦN THƠ
Nguyễn Ngọc Diệp