

Lần đầu: 19/6/2013

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Mẫu nhãn hộp

Mộc hoa trắng

Nguồn gốc thảo dược

6 vỉ x 10 viên bao đường

Mộc hoa trắng

6 vỉ x 10 viên bao đường

TIÊU CHUẨN: TCCS

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - TP. Hải Dương
Tel/Fax: (0320)3.853848

Sân xuất tại:
CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - TP. Hải Dương
Tel/Fax: (0320)3.853848

Nguồn gốc thảo dược

Mộc hoa trắng

6 vỉ x 10 viên bao đường

THÀNH PHẦN: Mỗi viên có chứa:

Cao đặc Mộc hoa trắng 1/10.....	100mg
(Trung đương 1000mg Vỏ Mộc hoa trắng)	
(Cortex Holarrhenae)	
Tá được.....	vũ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong các trường hợp đau quận bụng, mốt rận, đầy hơi, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm đại tràng cấp và mạn tính do amip cả hai thể hoạt động và kén.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn:
Mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2 - 3 lần.

Trẻ em:
Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 - 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người suy giảm chức năng gan
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

2. Mẫu màng vỉ

2. Mẫu màng ví

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MỘC HOA TRẮNG

Dạng bào chế: Viên nén bao đường

Thành phần:

Cao đặc Mộc hoa trắng 1/10 100mg

(Tương đương 1000mg Vỏ Mộc hoa trắng (*Cortex Holarrhenae*))

Tá dược:.....vd 1 viên

(Tá dược bao gồm: *Lactose, Tinh bột sắn, Bột talc, Magnesi stearat, Polyvinyl Pyrrolidone, Hydroxy propyl methyl cellulose, Poly ethylen glycol 6000, Titan dioxyd, Calci carbonat, Đường trắng, Erythrosin, Ethanol 80%, Than hoạt tính*).

Chỉ định:

Dùng trong các trường hợp đau quặn bụng, mót rặn, đầy hơi, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm đại tràng cấp và mạn tính do amip cả hai thể hoạt động và kén.

Chống chỉ định:

- Người suy giảm chức năng gan
- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên, ngày uống 2 - 3 lần.

Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên, ngày uống 2 - 3 lần.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng cho trẻ em.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không tác động đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc: Clopromazin, barbiturat, gluconat kali có tác dụng làm giảm độc tính của thuốc.

Quá liều và xử trí: Khi dùng liều lớn (trên 500mg conessin/ngày) có thể ảnh hưởng đến thần kinh như xuất hiện trạng thái tâm thần lo lắng, mất ngủ, chóng mặt, có khi gây ảo giác.

Xử trí: Ngừng uống thuốc, tham vấn nhân viên y tế.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Trình bày: Đóng vỉ 10 viên, 6 vỉ/hộp.

Chú ý:

- Không dùng quá liều chỉ định
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/Fax : 0320.853848

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh



[Handwritten signature]