

MAU HỘP 20 gói
80mm



Mucinex®

Acetylcysteine 200mg

Powder for oral suspension in sachet | Box 20 sachets x 3g



MEDIPHARCO TENAMYD BR S.r.l.

Manufactured by: MEDIPHARCO-TENAMYD BR S.r.l.
PHARMACEUTICAL JOINT STOCK JOINT VENTURE COMPANY.
08 Nguyễn Trường Tộ Street, Huế City, Thừa Thiên Huế Province.

65mm

Thành phần:

Acetylcystein.....200mg
Tá dược vừa đủ.....3 gam

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều lượng và cách dùng

- Các thông tin khác:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Mucinex®

Acetylcystein 200mg

Thuốc bột pha
hỗn dịch uống | Hộp 20 gói bột x 3g



MEDIPHARCO TENAMYD BR S.r.l.

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM
MEDIPHARCO TENAMYD BR S.r.l.
08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

75mm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12/10/2016

Hướng dẫn sử dụng:

- Cắt túi theo đường gạch chấm chỉ dẫn, đổ gói thuốc vào cốc.
- Đổ nước đầy vào túi thuốc.
- Rót nước từ túi thuốc vào cốc đã đựng thuốc.
- Khuấy đều và uống ngay.



SĐK.:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Mucinex®

Acetylcystein 200mg





Mẫu giấy nhôm 3g



Mucinex[®]
Acetylcystein 200mg

Thuốc bột
pha hỗn dịch uống | Gói 3g



Medipharco Tenamydo Br.s.r.l

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM
MEDIPHARCO TENAMYDO BR.S.R.L.
08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn sử dụng:

- Cắt túi theo đường gạch chấm chỉ dẫn, đổ gói thuốc vào cốc.
- Đổ nước đầy vào túi thuốc.
- Rót nước từ túi thuốc vào cốc để đựng thuốc.
- Khuấy đều và uống ngay.

Thành phần:

Acetylcystein.....	200mg
Tá dược vừa đủ.....	3 gam

Điều kiện bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số lô SX:
HD:

ph

110mm

70mm

