

k2
150

MẪU VỈ NADYBENCOZ
VỈ 10 viên nang cứng



DT



Ngày 30 tháng 05 năm 2014



ĐS. Bùi Ngọc Thống

MẪU HỘP VỈ NADYBENCOZ

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN NANG CỨNG NADYBENCOZ

k2/150

NADYBENCOZ

Viên nang cứng

CÔNG THỨC:

Cobamamid (Dibencozid)

3 mg

Tá dược: Magnesi stearat, lactose vừa đủ

1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH:

- Các bệnh về máu: Thiếu máu ác tính tự phát hoặc sau khi cắt dạ dày, thiếu máu đại hồng cầu và các trường hợp thiếu vitamin B₁₂ do hấp thu kém.
- Một số bệnh thần kinh như: Đau dây thần kinh tọa, đau dây thần kinh cổ - cánh tay, đau do các bệnh thần kinh.
- Thuốc bổ cho trẻ em suy dinh dưỡng, người bệnh bị mệt mỏi hoặc tình trạng dễ bị mệt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Dị ứng với cobamamid (dibencozid) hoặc vitamin B₁₂.
- Người có khối u, ung thư vì làm tế bào ác tính phát triển nhanh hơn.

THẬN TRỌNG:

Tránh sử dụng thuốc cho người có cơ địa dị ứng (suyễn, chàm).

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ

VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- Có thể gây phản ứng phản vệ, sốt.
 - Phản ứng dị ứng (ngứa, mẩn ngứa, đỏ da).
 - Nước tiểu có màu đỏ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Các đặc tính dược lực học:

- Cobamamid (dibencozid) là adenosylcobalamin một dạng coenzym vitamin B₁₂, có tác dụng tạo máu. Trong cơ thể người cobamamid tạo thành các coenzym hoạt động là methylcobalamin và 5-deoxyadenosylcobalamin rất cần thiết cho tế bào sao chép và tăng trưởng. Methylcobalamin rất cần để tạo methionin và dẫn chất là S-adenosylmethionin từ homocystein.

- Ngoài ra, khi nồng độ vitamin B₁₂ không đủ sẽ gây ra suy giảm chức năng của một số dạng acid folic cần thiết khác ở trong tế bào. Bất thường huyết học ở các người bệnh thiếu vitamin B₁₂ là do quá trình này. Cobamamid rất cần cho sự đồng hóa, chuyển L-methylmalonyl CoA thành succinyl CoA. Vitamin B₁₂ rất cần thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh trưởng tế bào mạnh như các mô tạo máu, ruột non, tủy xương. Thiếu vitamin B₁₂ cũng gây hủy myelin sợi thần kinh.

Các đặc tính dược động học:

- Sau khi uống, cobamamid được hấp thu qua ruột, chủ yếu ở hồi tràng theo 2 cơ chế: Cơ chế thụ động khi lượng dùng nhiều; và cơ chế tích cực, cho phép hấp thu những liều lượng sinh lý, nhưng cần phải có yếu tố nội tại là glycoprotein do tế bào thành niêm mạc dạ dày tiết ra. Mức độ hấp thu khoảng 1% không phụ thuộc vào liều và do đó ngày uống 1 mg sẽ thỏa mãn nhu cầu hàng ngày và đủ để điều trị tất cả các dạng thiếu vitamin B₁₂.
- Sau khi hấp thu, cobamamid liên kết với transcobalamin II và được loại nhanh khỏi huyết tương để phân bố ưu tiên vào nhu mô gan. Gan chính là kho dự trữ vitamin B₁₂ cho các mô khác. Khoảng 3 microgam cobamamid thải trừ vào mật mỗi ngày, trong đó 50 - 60% là các dẫn chất của cobamamid không tái hấp thu lại được.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều.

LIỀU DÙNG:

- Người lớn: Uống 1 viên/lần, ngày 1 - 2 lần.
- Trẻ em 30 tháng đến 15 tuổi: Uống 1 viên/ngày.

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên

Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản xuất: Theo TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP HCM

ĐT: (08) 38687355

FAX: 84.8.38687356

Nhà MÁY: 930 C4, đường C, KCN Cát Lái, cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM

Ngày 24 tháng 2 năm 2014



DS. Bùi Ngọc Thống



TUQ CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy