


**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/12/2012

[Handwritten signature]

 OPHSTAR OPHTHALMIC SOLUTION	
THÀNH PHẦN: Cho 1 lọ 15 ml: Sodium chloride 0.033g Tá dược (Borneol, Benzalkonium chloride, Acid boric, Natri borat, nước cất vừa đủ 15ml) CHỈ ĐỊNH: - Mỏi mắt, ngứa mắt, khô mắt. - Bụi bẩn, nhử mắt. - Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt. LIỀU VÀ CÁCH DÙNG: Nhỏ 3 - 5 giọt vào mắt mỗi ngày 4 đến 6 lần. Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần. Thuốc dùng được cho trẻ em. TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ, THẬN TRỌNG: Xem toa hướng dẫn sử dụng. SDK:	 THUỐC NHỎ MẮT OPHSTAR Nhà SX: CÔNG TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG 102 Chi Lăng - Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương Nhà PP: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH 351 De La Thành, Đống Đa, Hà Nội COMPOSITIONS: Bottle of 15ml contains: Sodium chloride 0.033g Excipients (Borneol, Benzalkonium chloride, Boric Acid, Sodium borate, distilled water) q.s 15ml INDICATIONS: - Tired eyes, itchy eyes, dried eyes. - Eye irritation due to dust, fume. - Prevention and treatment of sore eyes. Reg.No:
78.64.20 	
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM/ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Số lô SX: NSX : HD :	



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc nhỏ mắt **OPHSTAR**

CÔNG THỨC: cho 1 lọ x 10 ml

Natri clorid	0,022g
Tá dược (Borneol, Benzalkonium clorid, Acid boric, Natri borat, nước cất).....vđ.....	10ml

Cho 1 lọ x 15 ml

Natri clorid	0,033g
Tá dược (Borneol, Benzalkonium clorid, Acid boric, Natri borat, nước cất).....vđ.....	15ml

TRÌNH BÀY: Hộp 1 lọ x 15 ml, hộp 1 lọ 10ml.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

OPHSTAR tạo thành hệ đệm đẳng trương, ổn định và vô khuẩn, được bào chế để phòng tránh đau mắt, kích ứng mắt, loại trừ bụi bẩn, ghèn dử mắt và giảm các triệu chứng khó chịu của mắt.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Chưa có thông tin

CHỈ ĐỊNH:

- Mọi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt.
- Bụi bẩn, ghèn dử mắt.
- Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Nhỏ 3 - 5 giọt vào mắt mỗi ngày 4 đến 6 lần. Có thể dùng nhiều lần trong ngày khi cần. Thuốc dùng được cho trẻ em.

Lưu ý: Một vài hoạt chất có thể kết tinh ở miệng lọ trong quá trình bảo quản. Nếu có kết tinh thì nên lau miệng lọ bằng gạc sạch trước khi dùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG:

Không có

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thời kỳ mang thai: Dùng được

Thời kỳ cho con bú: Dùng được



TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Dùng được.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc gây nên.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không có

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa thấy có báo cáo về sử dụng quá liều

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sỹ

Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

BẢO QUẢN:

Nơi khô, Nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

Đề xa tầm tay của trẻ em.

TIÊU CHUẨN:

TCCS

Nhà sản xuất

CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 102 Chi Lăng, TP Hải Dương

Điện thoại: 03203 853 848

Nhà phân phối

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG THÀNH

Địa chỉ: 351 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.2732541



Handwritten signature and initials in blue ink.