



Mẫu nhãn lọ 5ml



* Ghi chú: Số lô SX và hạn dùng được in phun trên thân lọ

Tờ hướng dẫn sử dụng

OFLEYE DX

Thuốc nhỏ mắt

CÔNG THỨC:

Ofloxacin.....15 mg
Dexamethason Natri phosphat.....5 mg
Tá dược: (Acid hydrochloric, Natri tetraborat, Dinatri edetat, Anhydrous sodium sulphite, Benzalkonium clorid, nước cất) vđ.5 ml

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc nhỏ mắt Ofleye Dx được chỉ định cho những tình trạng viêm ở mắt có đáp ứng với corticoid và chỉ định khi có những nhiễm khuẩn nặng ở mắt hay có nguy cơ nhiễm khuẩn mắt.

Thuốc được chỉ định trong những tình trạng nhiễm trùng ở phần ngoài mắt (viêm kết mạc, viêm giác mạc), hoặc những bộ phận phụ (viêm mí mắt, viêm túi lệ) do những chủng vi khuẩn nhạy cảm với Ofloxacin.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Nhỏ vào mắt bị bệnh: 1 giọt/ lần, 2-4 giờ/ lần, dùng trong 2 ngày đầu.

1 giọt/ lần, 4 lần/ ngày, dùng trong 5 ngày sau. Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc hoặc bất kỳ kháng sinh nào thuộc nhóm Quinolon.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Trẻ em dưới 15 tuổi.
- Nhiễm virus tại chỗ, vi nấm ở mắt, glaucoma.

THẬN TRỌNG:

- Ở người bệnh nhiễm khuẩn hoặc nghi ngờ nhiễm khuẩn, phải đặc biệt chú ý và điều trị bằng các thuốc kháng khuẩn đặc hiệu là cần thiết trước tiên, do tác dụng ức chế miễn dịch nên dexamethason có thể gây nên những cơn kịch phát và lan rộng nhiễm khuẩn.
- Không được dùng thuốc để điều trị dự phòng (do nguy cơ chọn lọc chủng đề kháng).
- Không tiêm thuốc dưới kết mạc hoặc nhỏ thẳng vào tiền phòng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có nghiên cứu đặc biệt nào được thực hiện với thuốc nhỏ mắt Ofleye Dx dùng tại chỗ. Sự tương tác giữa từng thành phần đã được ghi nhận khi dùng đường toàn thân, tuy nhiên, sự hấp thu của ofloxacin và dexamethason theo đường dùng tại chỗ rất ít nên nguy cơ tương tác thuốc rất thấp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các phản ứng do nhạy cảm có thể thường xảy ra như: Kích ứng tại chỗ, đỏ mắt, tăng nhãn áp, phản ứng dị ứng, đục thủy tinh thể khi

dùng dài ngày.

Tác dụng không mong muốn phụ thuộc vào hàm lượng corticoid gồm: tăng nhãn áp, có khả năng phát triển thành glôcôm và đôi khi có thể tổn hại thần kinh mắt.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰC HỌC, ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

*Được lực học:

- Ofloxacin là thuốc kháng khuẩn nhóm fluoroquinolon, có phổ kháng khuẩn rộng bao gồm *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria spp.*, *Staphylococcus*, *Streptococcus pneumoniae* và một vài vi khuẩn Gram dương khác.

Thuốc cũng có tác dụng đối với *Mycobacterium leprae* và cả với *Mycobacterium tuberculosis* và vài *Mycobacterium spp.* khác.

Cơ chế tác dụng:

- Ofloxacin có tác dụng diệt khuẩn. Giống như các thuốc quinolon kháng khuẩn khác, ofloxacin ức chế DNA - gyrase là enzym cần thiết trong quá trình nhân đôi, phiên mã và tu sửa DNA của vi khuẩn.

- Dexamethason Natri phosphat có các tác dụng chính của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Về hoạt lực chống viêm, dexamethason mạnh hơn hydrocortison 30 lần, mạnh hơn prednisolon 7 lần.

*Được động học:

Thuốc được hấp thu qua kết mạc, giác mạc, phân bố vào dịch cơ thể, xâm nhập vào các mô, thuốc được đào thải chủ yếu qua thận, một ít qua phân hay bằng thẩm thấu máu.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ LÝ:

Ngừng sử dụng khi có hiện tượng phù nề, gây kích thích, cay mắt.

LỖI KHUYẾN CÁO:

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Đề xa lăm tay trẻ em.

Không sử dụng nếu thấy thay đổi màu sắc hoặc kết tủa.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ 5ml, hộp 1 lọ

HẠN DÙNG:


24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp lọ.



CTCP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD

8 Nguyễn Trường Tộ - Tp.Huế - Việt Nam
ĐT: 054. 3823099 - 3827215 Fax: 054.3826077



DS. Phạm Thị Bình