

Mẫu nhãn OMEPURE
Hộp 30 viên (3 vỉ x 10 viên)
100% real size



Mẫu nhãn OMEPURE
Hộp 100 viên (10 vỉ x 10 viên)
60% real size



100% real size



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

OMEPURE®

Viên nang mềm

(EPA 360 mg, DHA 240 mg)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Dầu cá (Omega-3 60%).....1000mg

Trong đó:

- Eicosapentaenoic acid (EPA) 360 mg

- Docosahexaenoic acid (DHA) 240 mg

Tá dược: Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Methylparaben, Ethyl vanillin, Titanium dioxide, Sunset yellow, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên nang mềm.

TÍNH CHẤT:

EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid) là những acid béo chủ yếu của omega-3, có nhiều trong dầu cá ngừ, cá hồi, cá thu. Đặc biệt, EPA và DHA (trong omega-3) có thể giúp:

- Cải thiện tình trạng sức khỏe tim mạch. Người ta đã chứng minh omega-3 có vai trò giữ cho nồng độ cholesterol trong máu thấp, chống loạn nhịp tim và làm giảm huyết áp.

- Cải thiện tình trạng viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, bệnh Raynaud và các bệnh lý tự miễn khác.

- Cải thiện chứng trầm cảm và các triệu chứng của các bệnh lý tâm thần khác. Não chứa một lượng đáng kể các chất béo. 60% trọng lượng não là các chất béo và cần omega-3 để bảo đảm các chức năng hoạt động của nó.

Giúp ngăn ngừa và hỗ trợ chứng ung thư. Các acid béo trong omega-3 giúp duy trì các mô tế bào tuyến vú được khỏe mạnh và ngăn ngừa ung thư vú. Trong một nghiên cứu gần đây, những đối tượng bổ sung dầu cá vào chế độ ăn thì ít sinh ra các chất gây ung thư đại tràng hơn so với nhóm chứng không sử dụng dầu cá.

CHỈ ĐỊNH:

Giúp phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý của lứa tuổi trung niên như tim mạch, cao huyết áp, tiểu

đường, stress, suy nhược, béo phì. Tăng cường chức năng gan, chống viêm gan. Cải thiện viêm khớp, phong thấp, ngừa dị ứng, hen suyễn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: uống 1 viên, ngày 1-2 lần cùng với bữa ăn. Nuốt nguyên viên, không nhai viên thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ:

Các tác dụng phụ có thể gặp của omega-3 bao gồm cảm giác vị tanh của cá sau khi uống và các rối loạn tiêu hoá; những tác dụng phụ này thường có liên quan đến liều dùng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Các axit béo trong omega-3 có thể ảnh hưởng lên thời gian chảy máu và tác dụng này tùy thuộc theo liều. Tuy nhiên, không có trường hợp nào có đủ tài liệu chứng minh có chảy máu bất thường do uống bổ sung dầu cá ngay cả khi sử dụng liều cao và dùng phối hợp với các thuốc kháng đông khác.

QUÁ LIỀU: Không có thông tin về sự quá liều Omega-3. Trong trường hợp quá liều Omega-3, tiến hành điều trị triệu chứng.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY: Vi 10 viên nang mềm. Hộp 3 vi và hộp 10 vi.

TIÊU CHUẨN: TCCS

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đề xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A

KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

ĐT: 0613-566205 Fax: 0613-566203

