


PHIL
INTER PHARMA

PHIL INTER PHARMA

No. 25, No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong
Tel: 0650. 3767 040~044 Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN VĨ

Sản phẩm : Viên nang mềm **OMITAN**
Kích thước vĩ : 97 x 56 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung : như mẫu



Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập nổi trên vĩ



PHIL
INTER PHARMA

PHIL INTER PHARMA

No. 25, No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong
Tel: 0650. 3767 040-044 Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang mềm OMITAN 90 viên
Kích thước hộp : 110 x 105 x 60 mm
Tỷ lệ : 70%
Nội dung : như mẫu



- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Thuốc điều trị viêm gan
OMITAN viên nang mềm.
(Biphenyl dimethyl dicarboxylate)

Biphenyl Dimethyl Dicarboxylat (PMC) là chất tổng hợp tương tự Schisandrin C - một thành phần được phân lập từ quả Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae), một loại thuốc cổ truyền của truyền của Trung Hoa. Vào những năm đầu thập niên 70, người ta đã phát hiện ra rằng Fructus Schisandrae có tác dụng cải thiện chức năng gan và cải thiện các triệu chứng ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn tính. PMC là chất trung gian để tổng hợp chất đồng phân vùng của Schisandrin C.

Tính cơ, PMC đã được phát hiện là có khả năng chống lại sự tổn thương gan gây ra do CCl₄, D-galactosamine, thioacetamide và prednisolone ở chuột nhắt và chuột cống. Người ta thấy rằng PMC có độc tính rất thấp. Kể từ năm 1977, PMC đã được thử dùng trên lâm sàng để điều trị các bệnh nhân viêm gan siêu vi B. Kết quả cho thấy rằng PMC cải thiện đáng kể tình trạng suy chức năng gan ví dụ như sự tăng SGPT, bilirubin, α -fetal protein (α -FP) và các triệu chứng ở bệnh nhân.

OMITAN có hiệu quả cao trong dự phòng và điều trị suy gan, tiền xơ gan và viêm gan nhờ vào khả năng bảo vệ gan và cải thiện hoạt động chức năng gan đã bị suy giảm.

■ **THÀNH PHẦN**

Mỗi viên nang chứa:

Biphenyl dimethyl dicarboxylate..... 3 mg.

Tá dược: Polyethylen glycol 400, Triethyl citrate, Polysorbat 80, Gelatin, Glycerin, D-sorbitol, Ethyl vanillin, Màu xanh dương số 1, Màu đỏ số 40, Màu đỏ số 3, Nước tinh khiết.

■ **DƯỢC LÝ HỌC & ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ**

1. Ức chế sự phân hủy tế bào gan

OMITAN ức chế sự peroxyl hóa mỡ nhờ hoạt động thải trừ các gốc tự do và ức chế sự kết gắn đồng hóa trị của các chất gây độc cho gan với lipid của các tiểu thể bằng cách ổn định màng của chúng.

OMITAN cải thiện đáng kể chức năng gan đã bị suy giảm và làm giảm các triệu chứng chính của bệnh nhân.

2. Khử độc gan

OMITAN tăng cường chức năng khử độc gan: tăng tạo các cytochrome P450 trong lưới nội bào (có vai trò quan trọng trong cơ chế khử độc của gan).

3. Hoạt động tái tạo gan

OMITAN kích hoạt sự tái tạo gan bằng cách gia tăng trọng lượng gan và protein tiểu thể.

4. Tăng đáp ứng sinh miễn dịch

OMITAN có hiệu quả điều trị đáng kể lên quá trình gây độc miễn dịch do CCl₄ và Ketoconazole.

5. Bảo vệ gan chống lại các tác hại do thuốc và rượu

Bảo vệ tế bào gan khỏi thương tổn do các chất độc như rượu, các thuốc độc với gan (acetaminophen, kháng sinh, kháng nấm, kháng ung thư, thuốc ngừa thai...).

6. Giảm nhanh chóng SGPT, SGOT

OMITAN chắc chắn là có hiệu quả cao hơn nhiều so với các thuốc khác trong việc làm giảm nồng độ SGPT, SGOT tăng cao bất thường.

■ **CHỈ ĐỊNH**

Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp:

- Viêm gan mạn tính có tăng nồng độ SGPT, SGOT.
- Viêm gan do virus, do rượu, gan nhiễm mỡ, viêm gan do thuốc (kháng sinh, kháng nấm, các thuốc sulfamid, thuốc chống lao, thuốc chống ung thư...).

■ **LIỀU LƯỢNG**

Người lớn, trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên x 3 lần mỗi ngày.

Có thể tăng liều dùng lên 2 viên x 3 lần/ngày nếu không thấy sự cải thiện sau 1 hoặc 2 tháng điều trị.

Thời gian điều trị thường 6 đến 12 tháng.

Trẻ em 6 – 12 tuổi: 2 – 3 viên/ngày.

Trẻ em 2 – 6 tuổi: 1 – 2 viên/ngày.

Trẻ em dưới 2 tuổi: cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Chống chỉ định thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

■ **THẬN TRỌNG**

Nên dùng thận trọng đối với những bệnh nhân sau:

- 1) Bệnh nhân bị viêm gan mạn tính thể hoạt động.
- 2) Bệnh nhân bị xơ gan.
- 3) Cần giảm liều dùng khi chỉ định thuốc cho trẻ em.
- 4) Nhìn chung, người già có chức năng sinh lý kém. Do đó, nên dùng thận trọng bao gồm giảm liều dùng.

■ **TÁC DỤNG PHỤ**

- Thỉnh thoảng khô miệng, buồn nôn hoặc phát ban da có thể xảy ra. Tuy nhiên, các triệu chứng này sẽ biến mất khi dùng thuốc kháng dị ứng.
- Vàng da thoáng qua có thể xảy ra. Tuy nhiên, triệu chứng này sẽ biến mất khi ngưng thuốc hoặc dùng các liệu pháp điều trị vàng da thích hợp.
- Hiếm xảy ra buồn nôn và đầy bụng.

* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

■ **TƯƠNG TÁC THUỐC**

Không có

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

■ **BẢO QUẢN:** Bảo quản trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

■ **ĐÓNG GÓI:** 10 viên nang/vi, 9 vi/ hộp.

■ **TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất bởi
Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA
 Số. 25, Đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương.

