

# MẪU NHÃN THUỐC

121/136

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 24 / 9 / 2012



KT: 78x20x65



## THÀNH PHẦN:

Mỗi lọ 15ml chứa: Natri clorid ..... 33mg  
Tá dược gồm: Borneol, benzalkonium clorid, acid boric, natri borat, ethanol 90o, nước cất pha tiêm ..... vđ 15ml

## CHỈ ĐỊNH:

Thuốc dùng trong các trường hợp:  
Mỏi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt, xốn (cộm) mắt, đỏ mắt, mờ mắt, chảy nước mắt, mắt khó chịu.  
Rửa mắt để các loại các vật lạ như bụi bẩn vào mắt, làm sạch gờn rí, Phòng ngừa các bệnh đau mắt.

## LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em: Nhỏ 2 - 4 giọt mỗi mắt/ lần 2-4 lần/ ngày. Có thể nhỏ nhiều lần hơn nếu cần.

\* Lưu ý: Đậy kín nắp sau khi dùng. Sử dụng thuốc trong vòng 15 ngày sau khi đã mở nắp lần đầu.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với một số thành phần của thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS

**SĐK:**

Sản xuất tại:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
La Khê - Hà Đông - T.P Hà Nội

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai

## Hướng dẫn sử dụng thuốc OPTIHATA

- **Dạng thuốc:** Thuốc nhỏ mắt
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 1 lọ x 15ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- **Công thức bào chế cho 1 đơn vị (lọ 15ml) thành phẩm:** Mỗi lọ (15ml) chứa:

|              |      |
|--------------|------|
| Natri clorid | 33mg |
| Tá dược vđ   | 15ml |

(Tá dược gồm: Borneol, benzaikolium clorid, acid boric, natri borat, ethanol 90°, nước cất pha tiêm).

- **Chỉ định:** Thuốc được dùng trong các trường hợp:
  - Mỏi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt, xốn (cộm) mắt, đỏ mắt, mờ mắt, chảy nước mắt, mắt khó chịu.
  - Rửa mắt để loại các vật lạ như bụi bẩn vào mắt, làm sạch ghèn rỉ mắt.
  - Phòng ngừa các bệnh đau mắt.
- **Cách dùng và liều dùng:**

Người lớn và trẻ em: Nhỏ 2-4 giọt mỗi mắt/ lần 2-4 lần/ ngày. Có thể nhỏ nhiều hơn nếu cần.
- \* **Lưu ý:** Đậy kín nắp sau khi dùng. Sử dụng thuốc trong vòng 15 ngày sau khi đã mở nắp lần đầu.
- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- **Thận trọng:** Chưa có báo cáo.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Dùng được.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có báo cáo.
- \* **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có báo cáo.
- **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo
- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.** Khi thấy thuốc có biểu hiện biến màu, vẩn đục, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

### ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

**THUỐC SẢN XUẤT TẠI:**  
**CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04..33522203 FAX: 04..33522203

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thanh*



Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*ĐS. Nguyễn Bá Lai*

