

# Ovagyl

Metronidazole, Miconazole Nitrate Micronized, Neomycin Sulfate, Polymyxin B Sulfate & Gotu Kola Soft Gelatin Vagina Capsules



Mỗi viên nang mềm chứa:

Metronidazole BP	300 Mg
Miconazole Nitrate Micronized BP	100 Mg
Neomycin Sulfate 48,8 Mg tương đương với Neomycin Sulfate BP	25 Mg
Polymyxin B Sulfate 4,40 Mg tương đương với Polymyxin B Sulfate BP	26400IU
Gotu Kola (Centellae Asian Herba)	15 Mg

Tá dược vừa đủ

Màu đã được phê duyệt được sử dụng trong vỏ viên nang Soft Gelatin.

## DƯỢC LỰC HỌC:

Ovagyl nó được kết hợp để chữa bệnh, tái tạo và bảo vệ hành động mô của Gotu Kola, với hiệu quả chống nhiễm trùng từ các thành phần hoạt động khác trên màng âm hộ. Rau má kích thích quá trình tạo hạt và thúc đẩy quá trình biểu mô đầy đủ neomycin và polymyxine có phổ vi khuẩn rộng, trên Gram vi trùng tích cực và tiêu cực, miconazole mang lại tác dụng kháng nấm và hành động diệt khuẩn metronidazole chống lại trichomonas, giardias và amip.

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Bắt đầu với 1-2 viên đặt âm đạo hàng ngày. Khi các triệu chứng cải thiện, tiếp tục với 1 viên đặt hàng ngày, trước khi đi ngủ, cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn. Đưa nhẹ nhàng và sâu vào bên trong âm đạo. Áp dụng trong 5 đến 10 ngày, ít nhất.

## CHỈ ĐỊNH:

Điều trị tại chỗ viêm âm hộ đặc hiệu và không đặc hiệu, đặc biệt khi chúng có liên quan đến tổn thương âm đạo, viêm âm hộ, viêm âm đạo viêm cổ tử cung do vi khuẩn hoặc kích ứng, nhiễm nấm candida, nhiễm trùng roi, bệnh bạch cầu do bất kỳ nguyên nhân nào.

## TÁC DỤNG PHỤ:

Hiếm khi có thể xuất hiện: nóng rát, ngứa và kích ứng âm hộ. Hãy nhớ rằng không biết có bao nhiêu thành phần hoạt tính. Có thể được hấp thụ qua màng âm đạo, nó không thể loại trừ tác dụng toàn thân. Nguy cơ tăng lên ở bệnh nhân suy thận.

### \* Lưu ý:

- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm này hoặc imidazolic các dẫn xuất.
- Trong ba tháng đầu của thai kỳ.
- Các bà mẹ cho con bú.
- Bệnh nhân mắc các bệnh về huyết học
- Các bệnh hoạt động của hệ thần kinh trung ương..

### \* Thận trọng:

- Ovagyl nên được dùng thận trọng cho những bệnh nhân bị bệnh nặng, bệnh gan.
- Không sử dụng trước khi giao hợp. Việc sử dụng sản phẩm này không ngăn ngừa lây truyền các bệnh tình dục. Các thành phần của viên đặt âm đạo có thể làm yếu mũ của bao cao su và màng ngăn.

### \* Tương tác:

- Tránh thụ rửa âm đạo bằng chất kiềm.
- Do sản phẩm hấp thụ tại chỗ thấp nên tương tác toàn thân không thể bị loại trừ.
- Không nên kết hợp với: rượu (hiệu ứng antubuse), warfarine, coumarine (tác dụng chống đông máu) và disulfiram.

## QUÁ LIỀU:

Không có nguy cơ quá liều nếu sản phẩm được sử dụng đúng cách. trong trường hợp quá liều tìm kiếm sự trợ giúp y tế tại bệnh viện gần nhất.

## BẢO QUẢN:

- Bảo quản ở nhiệt độ phòng từ 15 đến 30 °C (59 đến 86 °F), tránh nhiệt (trên 30°C hoặc 86°F).
- Giữ sản phẩm để xa tầm tay của trẻ em.