

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nang mềm PARAGIN^{500mg}

TÊN THUỐC : PARAGIN^{500mg}

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm **PARAGIN^{500mg}** có chứa:

L-Ornithin L- aspartat.....500 mg

Tá dược (*Sáp ong trắng, Dầu cọ, Lecithin, Dầu đậu nành, Gelatin, Glycerin, Nipazin, Nipazol, Sắt đen oxyd, Sắt đỏ oxyd, Đỏ Ponceu 4R, Titan dioxyd, Ethylvanilin, Dầu parafin, Nước tinh khiết (RO)* vđ.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang mềm

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Vi 5 viên, hộp 12 vi.

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ

L-ornithine L-aspartate là một phức hợp muối kép, khác với thuốc chỉ có chứa L-ornithine thông thường, khi vào cơ thể hợp chất này phân ly thành hai acid amin là L-ornithine và L-aspartate. Hai acid amin này là nguyên liệu tham gia vào chu trình urea và quá trình tổng hợp glutamin. Sự tổng hợp glutamin ở nội bào còn nguyên vẹn là phương tiện rất hiệu quả trong việc điều chỉnh lượng amoniac đi vào chu trình tổng hợp urea. Do đó, sự phối hợp L-ornithine và L-aspartate có tác dụng tương hỗ trong quá trình làm giảm nồng độ amoniac (amoniac trong máu được sinh ra do phân hủy protid, gan có nhiệm vụ biến amoniac máu thành urê). Ngoài ra, Ornithine và Aspartate còn gián tiếp tham gia tạo ra năng lượng ATP để cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp urea và kích thích sự hoạt động các chức năng khác của gan. Đặc biệt chức năng chuyển hóa mỡ và tái tạo nhu mô gan. Đây là chức năng quan trọng trong điều trị gan nhiễm mỡ và điều trị viêm gan.

CHỈ ĐỊNH :

- Bệnh gan cấp tính hoặc mạn tính: Viêm gan, di chứng của viêm gan, loạn chức năng gan, tổn thương nhu mô gan, xơ gan.
- Điều trị các rối loạn khởi phát tiền hôn mê gan, hôn mê gan, bệnh não gan

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
- Bệnh nhân suy thận

THẬN TRỌNG TRONG KHI DÙNG THUỐC

- Thận trọng trong việc dùng thuốc đối với trẻ em và người cao tuổi

SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ THỜI KỲ CHO CON BÚ:

- Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thực sự cần thiết và dưới sự theo dõi chặt chẽ của Bác sĩ chỉ định

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI VẬN HÀNH MÁY MÓC TÀU XE :

- Nên cân nhắc khi dùng thuốc, vì đôi khi tác dụng phụ của thuốc có thể làm mất tập trung khi vận hành máy móc và tàu xe.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

- Cảm giác rất bỏng thanh quản hoặc buồn nôn có thể xảy ra, nhưng hiếm gặp.

Ghi chú :

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác Sĩ

CÁCH DÙNG-LIỀU DÙNG :

- Người lớn: 1-2 viên/ lần x3 lần/ ngày tùy theo tuổi và triệu chứng của bệnh. Đợt điều trị thường 3-4 tuần. Trường hợp nặng có thể tăng lên liều gấp đôi



BẢO QUẢN:

– Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG : TCCS số 0350-B-01-12

HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đề xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin , xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

93 Linh Lang-Ba Đình-Hà Nội*Điện thoại :04.37666912 - Fax: 04.37666914

Nhà máy SX:Lô M1-đường N3-KCN Hoà Xá-Nam Định*Điện thoại: 0350.3670733



07