

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

PHILMYRTOL 120 Viên nang mềm

SĐK: VD-10823-10

■ THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Myrtol 120 mg.

(Dầu đậu nành, Dầu lecithin, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Methyl parahydroxy benzoat, Propyl parahydroxy benzoat, Ethyl vanillin, Màu đỏ số 40, Titan dioxit, Nước tinh khiết).

■ CHỈ ĐỊNH

- Viêm phế quản cấp tính mãn tính
- Viêm xoang mũi
- Khó khạc đàm

■ LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Bệnh mãn tính: 120-240 mg myrtol (1-2 viên) 3 lần mỗi ngày trước bữa ăn.

Bệnh cấp tính: 240 mg (2 viên) 3-5 lần mỗi ngày.

Liều dùng có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi và triệu chứng bệnh.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân sỏi thận hoặc sỏi mật.

■ THẬN TRỌNG

Phụ nữ mang thai

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo.

■ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai

Mặc dù không có nguy cơ nào được chứng minh thuốc gây quái thai và có độc tính đối với bào thai, cần thận trọng khi dùng thuốc trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

■ TÁC DỤNG PHỤ

Chưa có báo cáo.

* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

■ QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo.

■ ĐÓNG GÓI: VI 10 viên nang mềm. Hộp 6 vi

■ BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, ở nhiệt độ phòng (dưới 30°C).

■ HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

■ TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở

Nhà sản xuất

Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA.

Số 25, đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.