




MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

473/136

1 - NHÃN VỈ POLACANMIN 2 (1 vỉ x 10 viên nén)




2 - NHÃN VỈ POLACANMIN 2 (1 vỉ x 15 viên nén)



Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2011


KT. Tổng Giám Đốc



ĐS. NGUYỄN TRUNG KIÊN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

3 - MẪU HỘP POLACANMIN 2 (2 vỉ x 15 viên nén)



Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2011

KT. Tổng Giám Đốc



DS. NGUYỄN TRUNG KIẾN

MẪU NHẬN THUỐC ĐĂNG KÝ

4 - MẪU HỘP POLACANMIN 2 (10 vỉ x 10 viên nén)



Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2011

KT. Tổng Giám Đốc

DR. NGUYỄN TRUNG KIẾN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

5 - NHÃN CHAI POLACANMIN 2 (100 viên nén)

Polacanmin[®] 2 <i>Dexchlorpheniramin maleat 2 mg</i>	CÔNG THỨC: Dexchlorpheniramin maleat 2 mg Tá đượcvd 1 viên nén	SẢN XUẤT THEO TCCS SDK: _____
	CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.	Mã Vạch

100 viên nén

 **GMP-WHO**

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
BẢO QUẢN NƠI KHÔ MÁT (NHIỆT ĐỘ ≤ 30°C),
TRÁNH ÁNH SÁNG.

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM N.I.C
Lô 11D Đường C - KCN Tân Tạo - Q.Bình Tân - TPHCM

Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2011

KT. Tổng Giám Đốc



DS. NGUYỄN TRUNG KIÊN

TẾ
LÝ DU
DUYỆ

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên Nén POLACANMIN 2

POLACANMIN 2 Viên Nén:

- ♦ Công thức (cho một viên nén):
 - Dexchlorpheniramin maleat 2 mg
 - Tá dược vừa đủ 1 viên nén.(Tinh bột sắn, lactose, dextrose anhydrous, magnesi stearat, povidon, nước RO).
- ♦ Chỉ định:
 - Viêm mũi dị ứng mùa và quanh năm. Những triệu chứng dị ứng khác như: Mày đay, viêm mũi vận mạch do histamin, viêm kết mạc dị ứng, viêm da tiếp xúc, phù mạch, phù quinke, dị ứng thức ăn, phản ứng huyết thanh, côn trùng đốt, ngứa ở người bị sỏi hoặc thủy đậu.
- ♦ Liều dùng:
 - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi : Uống 2 viên/lần, ngày 2 lần.
 - Trẻ em từ 6 – 12 tuổi: Uống 1 viên/ lần, ngày 2 lần. Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
- ♦ Chống chỉ định:
 - Quá mẫn với Dexchlorpheniramin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc
 - Người đang lên cơn hen cấp
 - Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt
 - Glacom góc hẹp
 - Tắc cổ bàng quang
 - Loét dạ dày chít, tắc môn vị - tá tràng.
 - Phụ nữ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ đẻ thiếu tháng.
 - Người bệnh dùng thuốc ức chế monoamin oxidase (MAO) trong vòng 14 ngày, tính đến thời điểm điều trị bằng dexchlorpheniramin vì tính chất chống tiết acetylcholin của dexchlorpheniramin bị tăng lên bởi các chất ức chế MAO.
- ♦ Thận trọng:
 - Không uống rượu và các thuốc an thần khi dùng thuốc.
 - Không vận hành xe, máy móc khi đang dùng thuốc
 - Khi có bệnh phổi mạn tính, thở ngắn hoặc khó thở
 - Người cao tuổi (trên 60 tuổi)
 - Không dùng quá liều chỉ định
- ♦ Tác dụng không mong muốn của thuốc:
 - Tác dụng an thần rất khác nhau từ ngủ gà nhẹ đến ngủ sâu, khô miệng, chóng mặt và gây kích thích xảy ra khi điều trị ngắt quãng. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh chịu đựng được các phản ứng phụ khi điều trị liên tục, đặc biệt nếu tăng liều từ từ.
 - *Thường gặp:*
 - + Hệ TKTW: Ngủ gà, an thần
 - + Tiêu hóa: Khô miệng
 - *Hiếm gặp:*
 - + Toàn thân: Chóng mặt
 - + Tiêu hóa: Buồn nôn
 - Nhận xét: Tác dụng phụ chống tiết acetylcholin trên thần kinh trung ương và tác dụng chống tiết acetylcholin ở người nhạy cảm (người bị bệnh glacom, phì đại tuyến tiền liệt và những tình trạng dễ nhạy cảm khác), có thể nghiêm trọng. Tần suất của các phản ứng này khó ước tính do thiếu thông tin.

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

- ♦ Tương tác thuốc
 - Các thuốc MAO làm kéo dài và tăng chống tiết acetylcholin của thuốc kháng histamin.
 - Ethanol hoặc thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương của Dexchlorpheniramin maleat.
 - Dexchlorpheniramin maleat ức chế chuyển hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc phenytoin.
- ♦ Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú :
 - Không nên sử dụng trừ trường hợp đặc biệt vì thuốc qua được nhau thai và sữa mẹ.
- ♦ Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc :
 - Vì thuốc gây ngủ nên không dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

- ♦ Trình bày:
 - Hộp 2 vỉ x 15 viên nén.
 - Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.
 - Chai 100 viên nén.
- ♦ Hạn dùng:
 - 36 tháng kể từ ngày sản xuất
- ♦ Bảo quản:
 - Nơi khô mát (nhiệt độ $\leq 30^{\circ}\text{C}$), tránh ánh sáng.
- ♦ Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY THUỐC

KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG GHI TRÊN HỘP

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC

Lô 11D đường C – KCN Tân Tạo – Q.Bình Tân – TP.HCM

ĐT : 7.541.999 – Fax: 7.543.999

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2011
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



ĐS. NGUYỄN TRUNG KIÊN

