



NHÃN HỘP

Hộp 1 vỉ x 6 viên

Rx

Thuốc kê đơn

1 vỉ x 6 viên

PROVAZTAS

Miconazol nitrat 1200mg

Viên nang mềm đặt âm đạo

HOA LINH

PROVAZTAS

Miconazol nitrat 1200mg

Viên nang mềm đặt âm đạo

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm chứa miconazol nitrat 1200 mg.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Quy cách: Hộp 1 vỉ x 6 viên.
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH HÀ NAM
Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

SLSX/LOT:
NSX/MFG:
HD/EXP:

Rx

Prescription drug

1 blister x 6 soft capsules

PROVAZTAS

Miconazole nitrate 1200mg

Vaginal soft capsules

HOA LINH

PROVAZTAS

Miconazole nitrate 1200mg

Vaginal soft capsules

Ingredients:
Each soft capsule contains miconazole nitrate 1200 mg.
Indications, Usage, Contraindications and other information: see the enclosed instruction for use.
Storage: At a dry place, protect from light, below 30°C.
Specification: In-house.
Keep out of reach of children
Read the instruction carefully before use

PROVAZTAS
Miconazole nitrate 1200mg

Manufactured by:
HOA LINH HA NAM PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Dong Van I Industrial Zone, Dong Van Ward, Duy Tien
Town, Ha Nam Province, Vietnam.



NHÃN HỘP

Hộp 2 vỉ x 3 viên

RxThuốc kê đơn 2 vỉ x 3 viên PROVAZTAS Miconazol nitrat 1200mg Viên nang mềm đặt âm đạo	PROVAZTAS Miconazol nitrat 1200mg Viên nang mềm đặt âm đạo
Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa miconazol nitrat 1200 mg. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C. Tiêu chuẩn: TCCS. Quy cách: Hộp 2 vỉ x 3 viên. Để xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SDK: Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH HÀ NAM Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. SLSX/LOT: NSX/MFG: HD/EXP:	
PROVAZTAS Miconazol nitrate 1200mg Vaginal soft capsules	RxPrescription drug 2 blisters x 3 soft capsules PROVAZTAS Miconazol nitrate 1200mg Vaginal soft capsules
	PROVAZTAS Miconazole nitrate 1200mg Ingredients: Each soft capsule contains miconazole nitrate 1200 mg. Indications, Usage, Contraindications and other information: see the enclosed instruction for use. Storage: At a dry place, protect from light, below 30°C. Specification: In-house. Keep out of reach of children Read the instruction carefully before use Manufactured by: HOA LINH HA NAM PHARMACEUTICAL CO., LTD. Dong Van I Industrial Zone, Dong Van Ward, Duy Tien Town, Ha Nam Province, Vietnam.



NHÃN VỈ

Vỉ 3 viên



Vỉ 6 viên





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PROVAZTAS

(Viên nang mềm đặt âm đạo Miconazol nitrat 1200 mg)

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC: Mỗi viên nang mềm đặt âm đạo chứa:

Thành phần dược chất: Miconazol nitrat 1200 mg.

Thành phần tá dược: Acid oleic, dầu parafin, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70%, triglycerid mạch trung bình, methylparaben, propylparaben, titan dioxyd.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang mềm đặt âm đạo.

Mô tả: Viên nang mềm hình oval, màu trắng đến vàng nhạt, bề mặt nhẵn, bên trong chứa dịch thuốc màu trắng đến vàng nhạt

CHỈ ĐỊNH

Điều trị nấm *Candida* âm hộ - âm đạo.

Do tác dụng kháng khuẩn đối với vi khuẩn Gram dương, thuốc dùng để điều trị bệnh nấm do bội nhiễm bởi vi khuẩn Gram dương.

Thuốc có tác dụng nhanh đối với triệu chứng ngứa đi kèm nhiễm khuẩn do nấm da và *Candida*. Tác dụng giảm ngứa thậm chí còn xảy ra trước khi thuốc bắt đầu có tác dụng điều trị.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Liều dùng

Đặt 1 viên thuốc vào sâu trong âm đạo vào buổi tối trước khi đi ngủ. Trong trường hợp tái phát, có thể dùng lặp lại. Nếu các triệu chứng xuất hiện rõ ràng và ở phụ nữ mang thai, do có yếu tố nguy cơ (mang thai), nên sử dụng thuốc ngay trong 2 ngày đầu. Nên điều trị đầy đủ ngay cả khi các triệu chứng biến mất nhanh và sử dụng tiếp trong thời kỳ kinh nguyệt.

Cách dùng:

Thuốc được dùng qua đường âm đạo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định dùng thuốc đối với những bệnh nhân quá mẫn với miconazol/miconazol nitrat, với các dẫn xuất imidazol khác hoặc với bất kỳ tá dược nào.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, bao gồm sốc phản vệ và phù mạch đã được báo cáo trong quá trình điều trị bằng thuốc và với các dạng miconazol dùng ngoài khác (*xem phần tác dụng không mong muốn của thuốc*). Nếu xảy ra phản ứng quá mẫn cảm hoặc kích ứng, nên ngừng điều trị.

Liệu pháp thích hợp được chỉ định khi bạn tình cũng bị nhiễm bệnh.

Việc sử dụng đồng thời bao cao su latex hoặc màng ngăn âm đạo có thể làm phá hủy các chất liệu latex. Vì vậy không nên sử dụng đồng thời thuốc với bao cao su hoặc màng ngăn latex.

Cảnh báo tá dược:

Thuốc này có chứa methylparaben, propylparaben có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm).

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thai kỳ:

Mặc dù sự hấp thu qua âm đạo là hạn chế, thuốc chỉ nên được sử dụng trong ba tháng đầu của thai kỳ nếu theo đánh giá của bác sĩ những lợi ích tiềm năng lớn hơn những rủi ro có thể xảy ra.

Phụ nữ cho con bú

Chưa biết miconazol có vào trong sữa người mẹ hay không, nên thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Miconazol nitrat được hấp thu qua đường âm đạo rất hạn chế. Vì vậy, tương tác với các thuốc dùng đường uống ít có khả năng xảy ra. Mặc dù vậy, thuốc có thể làm tăng tác dụng chống đông ở những bệnh nhân đang dùng warfarin.

Tác dụng và tác dụng phụ của một số loại thuốc khác (ví dụ: thuốc hạ đường huyết uống và phenytoin) khi dùng đồng thời với miconazol có thể tăng lên.

Nên tránh tiếp xúc giữa các sản phẩm latex như màng tránh thai hoặc bao cao su và viên thuốc vì các thành phần của viên đặt âm đạo có thể làm hỏng latex. (*xem phần cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Trong những tuần đầu sử dụng thuốc, có thể xảy ra các triệu chứng như: nóng rát và kích ứng âm đạo, co cứng hông, hiếm khi xảy ra phát ban và nhức đầu.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH HÀ NAM
Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam

