



Rx PV Xoang

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

1. Thành phần: Công thức cho 1 viên:

Table with 2 columns: Component name and Amount. Components include Cao đặc hỗn hợp (327,5 mg), Hoàng kỳ, Thương nhĩ tử, Tần di hoa, Bạch chi, Bạch truật, Phòng phong, Kim ngân hoa, Bạc hà, and inactive ingredients like Talc, calcium carbonate, etc.

- 2. Dạng bào chế: Viên nén bao đường
3. Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng; Hộp 3 vỉ x 20 viên nén bao đường; Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.
4. Chỉ định điều trị: Dùng trong các trường hợp bệnh xoang mũi, tắc mũi, chảy nước mũi, nhức đầu phần trán, viêm mũi, viêm mũi dị ứng.
5. Liều lượng và cách dùng: Người lớn: mỗi lần uống 5-7 viên, ngày uống 3 lần sau bữa ăn. Trẻ em: mỗi lần 3-5 viên, ngày uống 3 lần sau bữa ăn. Thời gian sử dụng thuốc mỗi đợt nên từ 30-45 ngày. Với các trường hợp mãn tính nên duy trì điều trị liên tục 2-3 đợt. Có thể cũng có nhắc lại định kỳ.
6. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo
7. Quá liều và xử trí: Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo, không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên. Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.
8. Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo
9. Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người đau tháo xương.
10. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai. Không dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
11. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.
12. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30° C, tránh ánh sáng.
13. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
14. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)
15. Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.33596583

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

1. Tên sản phẩm: [®]PV XOANG

2. Các câu khuyến cáo:

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

3. Mô tả sản phẩm:

- Viên nén bao đường màu hồng, nhân bóng, cạnh và thành viên lảnh lạn, cầm tay không dính phẩm và đường.
- Hộp 1 lọ 60 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng; Hộp 3 vỉ x 20 viên nén bao đường; Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

4. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 viên:

Cao đặc hỗn hợp	327,5 mg
(tương đương 1998 mg dược liệu, bao gồm:	
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragal membranacei</i>)	416,0 mg
Thương nhĩ tử (<i>Fructus Lycii strumaris</i>)	333,0 mg
Tân di hoa (<i>Magnoliae officinalis Flor</i>)	250,0 mg
Bạch chi (<i>Radix Angelicae dahuricae</i>)	250,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	250,0 mg
Phòng phong (<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>)	250,0 mg
Kim ngân hoa (<i>Flor Lonicerae</i>)	166,0 mg
Bạc hà (<i>Herba Menthae</i>)	83,0 mg
<i>Tá dược:</i> Talc, calci carbonat, PVP K30, PVP K90, nipagin, nipazol, Mg stearat, đường trắng, tinh bột sắn, erythrosine lake, parafin rắn vừa đủ 1 viên.	

5. Chỉ định điều trị

- Dùng trong các trường hợp bệnh xoang mũi, tắc mũi, chảy nước mũi, nhức đầu phần trán, viêm mũi, viêm mũi dị ứng.

6. Cách dùng và liều lượng

- Người lớn: mỗi lần uống 5-7 viên, ngày uống 3 lần sau bữa ăn.
- Trẻ em: mỗi lần 3-5 viên, ngày uống 3 lần sau bữa ăn.
- Thời gian sử dụng thuốc mỗi đợt nên từ 30-45 ngày. Với các trường hợp mãn tính nên duy trì điều trị liên tục 2-3 đợt. Có thể dùng cố nhắc lại định kỳ.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Trẻ em dưới 10 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
- Người dị ứng thuốc đường

8. Tác dụng không mong muốn

- Chưa có báo cáo
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

9. Tương tác với những thuốc khác

- Chưa có báo cáo

10. Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được khi lái xe và vận hành máy móc.

11. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

- Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo, không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp sau liều bị bỏ quên.

12. Bảo quản thuốc

- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30° C, tránh ánh sáng.

13. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

- Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

14. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo

- Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được theo dõi.

15. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty Cổ phần Dược Phúc Vinh
Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, xã Phùng Xá,
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.35596583

16. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

- Không có thận trọng đặc biệt.

17. Khi nào cần tham vấn bác sĩ

- Nếu cần thêm thông tin, có bất kỳ biểu hiện tác dụng không mong muốn xin tham vấn ý kiến bác sĩ.