

MẪU HỘP CHAI 30 ML SIRÔ
RICHCARBO



COMPOSITION:

Each 5ml syrup contains:
Carbocisteine 250mg
Excipients q.s.f 5ml


**INDICATIONS, ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONS AND OTHER
INFORMATION:**
READ THE PACKAGE INSERT.

STORAGE:
Store in a cool and dry place, protect from
light, below 30°C.

SPECIFICATIONS: Manufacturer's

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE
ORAL ROUTE

PHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC
USARICHPHARM FACTORY BRANCH
Block 12, Road 8, Tân Tạo IP, Bình Tân District, HCMC
Tel: (028) 37.547.997 Web: www.ducphongphu.vn



CÔNG THỨC:

Mỗi 5ml sirô chứa:
Carbocisteine 250mg
Tá dược vđ 5ml.

**CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**
XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh
sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (028) 37.547.997 Web: www.ducphongphu.vn

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



Mã vạch

Ngày ..26.. tháng ..06.. năm ..2021..
TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU NHÃN CHAI 30 ML SIRÔ
RICHCARBO

GMP-WHO

Richcarbo®

Carbocisteine
250mg/5ml

GIẢM HO



LONG ĐỜM

30ml

CÔNG THỨC: Mỗi 5ml sirô chứa:

Carbocisteine 250mg

Tá dược vđ 5ml.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG**CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN****KHÁC:** XEM TRONG TỜ HƯỚNG

DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh
ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.**TIÊU CHUẨN:** TCCS**SĐK:****ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



Mã vạch

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ



CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

ĐT: (028) 37.547.997

Web: www.duocphongphu.vn

Ngày 16... tháng 06... năm 2021.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU HỘP CHAI 45 ML SIRÔ
RICHCARBO



COMPOSITION:

Each 5ml syrup contains:
Carbocisteine 250mg
Excipients q.s.f 5ml

**INDICATIONS, ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONS AND OTHER
INFORMATION:**

READ THE PACKAGE INSERT.

STORAGE:

Store in a cool and dry place, protect from
light, below 30°C.

SPECIFICATIONS: Manufacturer's

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE
ORAL ROUTE

PHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC
USARICHPHARM FACTORY BRANCH
Block 12, Road 8, Tân Tao IP, Bình Tân District, HCMC
Tel: (028) 37.547.997 Web: www.duongphongphu.vn



CÔNG THỨC:

Mỗi 5ml sirô chứa:
Carbocisteine 250mg
Tá dược vđ 5ml.

**CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**
XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh
sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (028) 37.547.997 Web: www.duongphongphu.vn

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:



Mã vạch

Ngày/..../..../ năm/..../
TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU NHÃN CHAI 45 ML SIRÔ
RICHCARBO

GMP-WHO

Richcarbo®

**Carbocisteine
250mg/5ml**



45ml

✓ GIẢM HO ✓ LONG ĐÒM

CÔNG THỨC: Mỗi 5ml sirô chứa:

Carbocisteine 250mg

Tá dược vđ 5ml.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG

CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN

KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh
ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG**

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



Mã vạch

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ



CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

ĐT: (028) 37.547.997

Web: www.duocphongphu.vn

Ngày ... tháng ... năm ...

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU HỘP CHAI 60 ML SIRÔ
RICHCARBO



COMPOSITION:

Each 5ml syrup contains:

Carbocisteine 250mg
Excipients q.s.f 5ml

**INDICATIONS, ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONS AND OTHER
INFORMATION:**

READ THE PACKAGE INSERT.


STORAGE:

Store in a cool and dry place, protect from
light, below 30°C.

SPECIFICATIONS: Manufacturer's

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE
ORAL ROUTE

PHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC
USARICHPHARM FACTORY BRANCH
Block 12, Road 8, Tân Tao IP, Bình Tân District, HCMC
Tel: (028) 37.547.997 Web: www.ducphongphu.vn



Sirô

CÔNG THỨC:

Mỗi 5ml sirô chứa:

Carbocisteine 250mg
Tã được vđ 5ml.

**CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**
XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh
sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (028) 37.547.997 Web: www.ducphongphu.vn

Số lô SX:
Ngày SX:
HĐ:



Mã vạch

Ngày 26 tháng 06 năm 2021
TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU NHÃN CHAI 60 ML SIRÔ
RICHCARBO

GMP-WHO

Richcarbo®Carbocisteine
250mg/5ml

60ml



GIẢM HO



LONG ĐỜM

CÔNG THỨC: Mỗi 5ml sirô chứa:

Carbocisteine 250mg

Tá được vđ 5ml.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG**CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN****KHÁC:** XEM TRONG TỜ HƯỚNG

DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh

ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS**SĐK:****ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG**

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



Mã vạch

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

ĐT: (028) 37.547.997

Web: www.duocphongphu.vn

Ngày/.. tháng/.. năm

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Nhã Ngôn

Thái Nhã Ngôn

MẪU NHÃN CHAI 100 ML SIRÔ
RICHCARBO



CÔNG THỨC: Mỗi 5ml sirô chứa:

Carbocisteine 250mg

Tá dược vđ 5ml.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG

CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN

KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG

DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh

ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



Mã vạch

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ



CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

ĐT: (028) 37.547.997

Web: www.duocphongphu.vn

Ngày/.. tháng/.. năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU HỘP 20 GÓI x 5 ML SIRÔ
RICHCARBO



COMPOSITION:
Each 5ml syrup contains:
Carbocisteine 250mg
Excipients q.s.f 5ml

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:
READ THE PACKAGE INSERT.

STORAGE:
Store in a cool and dry place, protect from light, below 30°C.

SPECIFICATIONS: Manufacturer's

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.
GML, 60075

PHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC
USARICHPHARM FACTORY BRANCH
USARICHPHARM
13/12, Đường số 5, Khu 7B, Th. Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (028) 22.947.267
Web: www.usarichpharm.vn



CÔNG THỨC:
Mỗi 5ml sirô chứa:
Carbocisteine 250mg
Tá dược vớ 5ml.

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
XEM THÔNG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TÊN CHUẨN: TCSS

SPK:
Kể cả tiền và thuế GTGT
Được kê trước để được trước sau được
Được kê trước để được trước sau được

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
CHỈ NHẬN NHÀ MÁY USARICHPHARM
13/12, Đường số 5, Khu 7B, Th. Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (028) 22.947.267
Web: www.usarichpharm.vn



Ngày 26. tháng 06. năm 2021
TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

MẪU GÓI x 5 ML SIRÔ
RICHCARBO**CÔNG THỨC:** Mỗi 5ml sirô chứa:

Carbocisteine 250mg
Tá dược vđ 5ml.

**CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** XEM TRONG TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng,
nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



**CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: (028) 37.547.997 Web: www.duocphongphu.vn

Ngày 26. tháng 04. năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC




Thái Nhã Ngôn

MẪU HỘP 20 GÓI x 10 ML SIRÔ RICHCARBO

20 Sachets Richcarbo® Carbocisteine 500mg/10ml 10ml	Syrup Richcarbo® Carbocisteine 500mg/10ml Box of 20 sachets x 10ml 10ml RELIEVES COUGH LOOSENS MUCUS & PHLEGM USARICH PHARM	COMPOSITION: Each 10ml syrup contains: Carbocisteine 500mg Excipients q.s.l 10ml INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION: READ THE PACKAGE INSERT. STORAGE: Store in a cool and dry place, protect from light, below 30°C. SPECIFICATIONS: Manufacturer's KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE GMA, RM016 PHONG PHU PHARMACEUTICAL JSC USARICH PHARM FACTORY BRANCH Khu 72, Street 2, Tan Tan P., Binh Tan District, Ho Chi Minh City Tel: 028 35341955 Web: www.usarichpharm.com	Sirô Richcarbo® Carbocisteine 500mg/10ml Hộp 20 gói x 10ml 10ml GIẢM HO LONG DỊM USARICH PHARM	CÔNG THỨC: Mỗi 10ml sirô chứa: Carbocisteine 500mg Tá dược vớ 10ml. CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO. BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. TIÊU CHUẨN: TCCS SKK: để xa tầm tay trẻ em ngọc ký không dùng sai quy cách em không dùng thuốc khác CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICH PHARM Lô 72, Khu 72, Tân Tân P., Bình Tân Q., TP. HCM Tel: 028 35341955 Web: www.usarichpharm.com
Số lô SX: Ngày SX: HD: Mã vạch		Ngày ... tháng ... năm ... TỔNG GIÁM ĐỐC Thái Nhã Ngôn		



MẪU GÓI x 10 ML SIRÔ
RICHCARBO

Ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thái Nhã Ngôn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

RICHCARBO

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ

NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC

1. Thành phần công thức thuốc: 05 ml sirô chứa:

Thành phần dược chất: Carbocisteine 250 mg

Thành phần tá dược: Sodium hydroxide, Sorbitol sorbitan solution, Methylparaben, Erythrosine, Hương dâu lỏng, Vanillin, Đường trắng, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

2. Dạng bào chế: Sirô

Mô tả: Dịch sánh, trong, có mùi dâu, màu đỏ.

3. Chỉ định:

Carbocisteine có tác dụng loãng đờm, sử dụng điều trị hỗ trợ trong các bệnh lý đường hô hấp có tăng tiết chất nhầy, bao gồm cả bệnh tắc nghẽn đường hô hấp mạn tính.

4. Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng: Dùng đường uống. Nên uống thuốc xa bữa ăn.

Liều dùng:

Người lớn và người cao tuổi:

Liều dùng dựa trên liều lượng ban đầu: 15 ml x 3 lần/ ngày.

Khi tình trạng bệnh được cải thiện: 10 ml x 3 lần/ngày.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Trẻ em 2 - 5 tuổi: Liều thông thường là 1,25 - 2,5 ml, bốn lần mỗi ngày.

Trẻ em 5 - 12 tuổi: Liều thông thường là 5 ml x 3 lần/ ngày.

Thuốc không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi.

Khuyến cáo nếu quên uống một liều thuốc: Uống ngay 1 liều khi nhớ ra đã quên uống thuốc. Nếu thời gian nhớ ra gần liều kế tiếp thì bỏ liều đã quên và uống như theo thời gian quy định. Không uống liều gấp đôi trong trường hợp quên dùng thuốc.

5. Chống chỉ định:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Sử dụng cho bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng.

Trẻ em dưới 2 tuổi.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Cảnh báo đặc biệt các trường hợp:

Bệnh nhân hen có tiền sử co thắt phế quản.

Suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân suy nhược. Khi giảm phản xạ ho, có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở do lượng dịch tiết tăng lên.



Việc sử dụng Carbocisteine có nghĩa là làm giảm độ nhớt và loại bỏ chất nhầy bằng phản xạ ho. Do đó, dự kiến sẽ tăng ho và có đờm. Khuyến cáo không nên phối hợp thuốc này với thuốc chống ho.

Cần thận trọng khi sử dụng carbocisteine ở những người dễ bị loét dạ dày tá tràng, vì thuốc phân giải chất nhầy có khả năng phá hủy hàng rào niêm mạc dạ dày.

Thuốc này có chứa đường trắng. Bệnh nhân có các vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose-galactose hoặc suy sucrase-isomaltase không nên dùng thuốc này.

Methylparaben, Erythrosine: Có thể gây phản ứng dị ứng.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Mặc dù các thử nghiệm trên các loài động vật có vú không cho thấy tác dụng gây quái thai, nhưng không được khuyến cáo trong ba tháng đầu của thai kỳ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Người ta chưa biết liệu carbocisteine / các chất chuyển hóa của nó có được bài tiết vào sữa mẹ hay không

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Quy ước sau đây đã được sử dụng để phân loại tần suất phản ứng có hại: rất thường gặp ($> 1/10$), thường gặp ($> 1/100$ đến $< 1/10$), ít gặp ($> 1/1000$ đến $< 1/100$), hiếm gặp ($> 1/10.000$ đến $< 1/1000$) và rất hiếm gặp ($< 1/10.000$), không rõ tần suất (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn).

Ít gặp ($> 1/1000$ đến $< 1/100$)

Rối loạn tiêu hóa: Buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Hiếm gặp ($> 1 / 10.000$ đến $< 1/1000$)

Rối loạn tim: Đánh trống ngực

Rối loạn hệ thống miễn dịch: Mề đay và co thắt phế quản*

Rối loạn cơ xương và mô liên kết: Đau cơ

Rối loạn hệ thần kinh: Nhức đầu, chóng mặt, tiểu không tự chủ, hội hộp

Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất: Khó thở.

Rất hiếm gặp ($< 1 / 10.000$)

Rối loạn tiêu hóa: Xuất huyết dạ dày

Rối loạn hệ thống miễn dịch: Phát ban.

Không rõ tần suất

Rối loạn nội tiết: Suy giáp**

Rối loạn tiêu hóa: Khó chịu ở dạ dày

Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất: Tăng tiết phế quản

Rối loạn da và mô dưới da: Hội chứng Stevens-Johnsons, hồng ban đa dạng.

(*)= Đặc biệt chú ý ở bệnh nhân hen do nguy cơ xảy ra co thắt phế quản (co cơ thành phế quản dẫn đến giảm luồng khí). Trong những trường hợp này, nên ngừng điều trị.

(**)= Đặc biệt chú ý ở những bệnh nhân bị tổn thương chức năng tuyến giáp do nguy cơ xuất hiện suy giáp thoáng qua.

142756
CÔNG TY
PHÂN
C PHÂN
NG PH
T.P.HO

11. Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Rối loạn tiêu hóa là triệu chứng có thể có của quá liều Carbocisteine.

Cách xử trí: Rửa dạ dày, sau đó là theo dõi.

12. Đặc tính dược lực học:

Nhóm dược lý: Thuốc long đờm và loãng đờm.

Mã ATC: R05CB03

Carbocisteine (S-carboxymethyl L-cysteine) đã cho thấy tác động đến tính chất và số lượng của chất nhầy glycoprotein được tiết ra bởi đường hô hấp trên các mẫu động vật bình thường và viêm phế quản. Sự gia tăng tỷ lệ acid: Tỷ lệ glycoprotein trung tính của chất nhầy và sự chuyển đổi tế bào huyết thanh thành tế bào chất nhầy được biết là phản ứng ban đầu đối với kích thích và thường có sự tăng tiết theo sau đó. Một số nghiên cứu ở người đã chứng minh rằng carbocisteine làm giảm sự tăng sản tế bào biểu mô đường hô hấp. Do đó, carbocisteine có thể được chứng minh là có vai trò trong việc kiểm soát các rối loạn đặc trưng bởi chất nhầy bất thường.

13. Đặc tính dược động học:

Carbocisteine được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Thời gian đạt nồng độ đỉnh T_{max} trung bình là 2,0 giờ (khoảng 1,0 – 3,0); Thời gian bán thải $T_{1/2}$ 1,87 giờ (khoảng 1,4 – 2,5); Diện tích dưới đường cong AUC_{0-7,5} là 39,26 mcg.giờ/ml (trong khoảng 26,0 – 62,4). Thể tích phân bố Vd 105,2 L và Vd 1,4 L/Kg.

14. Quy cách đóng gói:

- Hộp 20 gói x 5 ml sirô kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 20 gói x 10 ml sirô kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 01 chai x 30 ml sirô kèm 1 cốc phân liều và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 01 chai x 45 ml sirô kèm 1 cốc phân liều và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 01 chai x 60 ml sirô kèm 1 cốc phân liều và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- Hộp 01 chai x 100 ml sirô kèm 1 cốc phân liều và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

Điều kiện bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau mở nắp: 60 ngày kể từ khi mở nắp.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS số: KL-DU001

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ – CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM

Địa chỉ: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 09 tháng 08 năm 2024

Đại diện hợp pháp của cơ sở đăng ký

Tổng Giám Đốc



Thái Nhã Ngôn