




UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VÍ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



32/145 12



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

RUTIN – C FORT

Công thức bào chế cho : 1 viên

Acid ascorbic

60,0 mg

Rutin

60,0 mg

Tá dược: Tinh bột mỳ, Povidon, Talc, Magnesi stearat, Shellac, Màu sunset yellow, Đường trắng, Parafin, Ethanol 96%, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

Chỉ định điều trị: Hỗ trợ điều trị hội chứng chảy máu do kém vững bền thành mạch, xơ cứng, tăng huyết áp, ban xuất huyết, chứng giãn tim mạch (phù, đau, nặng chân, bệnh trĩ...)

Liều lượng và cách dùng: Ngày uống từ 2-3 lần

- Người lớn: 2- 3 viên/lần

- Trẻ em: 1 viên/lần

Chống chỉ định: Không dùng cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hoá oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Không được dùng cho trường hợp nghẽn mạch và máu có độ đông cao.

Tác dụng không mong muốn: Tăng Oxalat niệu, buồn nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ và tình trạng mất ngủ đã xảy ra. Nếu dùng liều 1g Vitamin C hàng ngày có thể xảy ra ỉa chảy.

- Một số trường hợp xảy ra rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh thực vật nhẹ, không cần phải ngưng điều trị.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Dùng đồng thời theo tỷ lệ trên 200mg vitamin C với 30mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày - ruột; tuy vậy, đa số người bệnh đều có khả năng hấp thu sắt uống vào một cách đầy đủ mà không phải dùng đồng thời vitamin C.

Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu.

Dùng đồng thời vitamin C với fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương. sự acid - hoá nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác.

Vitamin C liều cao có thể phá huỷ vitamin B₁₂; cần khuyên người bệnh tránh uống vitamin C liều cao trong vòng 1 giờ trước hoặc sau khi uống vitamin B₁₂.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú vì dùng lượng lớn Vitamin C trong thời kì mang thai và cho con bú có thể làm tăng nhu cầu về Vitamin C và dẫn đến bệnh Scorbut ở trẻ sơ sinh.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin



Sử dụng quá liều: Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và ỉa chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

Qui cách đóng gói: Ép vỉ 10 viên hộp 10 vỉ.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN IV

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 3 855906 Fax : 3856821

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

