

MẪU HỘP & NHÃN GÓI (thu nhỏ)
Số lô SX và hạn dùng được dập nổi trên gói.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25
SX: 4488 Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN

smanetta
Diosmectite - 3g
658g 30 gói 3,85g

smanetta
Diosmectite - 3g
Box of 30 sachets 3.85g

Powder for oral suspension

smanetta
Diosmectite - 3g

Thành phần:
Diosmectite (Dioctahedral smectite) ... 3g
Tá được v.d. 1 gói 3,85g

CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị các chứng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng
- Tiêu chảy cấp và mãn tính sau khi đã bù đủ nước và chất điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng.
Liều dùng & cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

smanetta
Diosmectite - 3g

Bột pha hỗn dịch uống

Tiêu chuẩn: TCCS

Thành phần:
Diosmectite (Dioctahedral smectite) ... 3g
Tá được v.d. 1 gói 3,85g

Chỉ định - Chống chỉ định:
Liều dùng & cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25
SX: 4488 Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN

smanetta
Diosmectite - 3g

Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

smanetta
Diosmectite - 3g
Hộp 30 gói 3,85g

Bột pha hỗn dịch uống

smanetta
Diosmectite - 3g

Thành phần:
Diosmectite (Dioctahedral smectite) ... 3g
Tá được v.d. 1 gói 3,85g

Chỉ định - Chống chỉ định:
Liều dùng & cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK :
Số lô SX :
HD :



MẪU TOA

smanetta

Bột pha hỗn dịch uống

THÀNH PHẦN:

Diosmectit (Diocetahedral smectite) 3 g
Tá dược (Glucose, Natri saccharin, Vanillin) v.d. 1 gói 3,85 g

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các chứng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá tràng và đại tràng.
- Tiêu chảy cấp và mãn tính sau khi đã bù đủ nước và chất điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn:
3 gói/ ngày, chia 3 lần. Trong tiêu chảy cấp liều khởi đầu có thể gấp 2 lần.
- Trẻ em:
Dưới 1 tuổi: 1 gói/ ngày chia 2 - 3 lần.
Từ 1 - 2 tuổi: 1 - 2 gói/ ngày chia 2 - 3 lần.
Trên 2 tuổi: 2 - 3 gói/ ngày chia 2 - 3 lần.
- Chú ý:
Hòa thuốc vào ½ ly (50ml) nước ấm, khuấy đều trước khi uống. Có thể thay thuốc bằng dịch thức ăn như nước chanh, nước rau.
Uống sau bữa ăn đối với người bệnh viêm thực quản.
Uống xa bữa ăn đối với các chỉ định khác.

THẬN TRỌNG:

- Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày.
- Nếu tiêu chảy mất nước cần bù nước kết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc tiêm truyền dịch tĩnh mạch, số lượng nước cần bù tùy theo tuổi, cơ địa và mức độ tiêu chảy.
- Cần thận trọng trường hợp tiêu chảy nặng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Rất hiếm trường hợp táo bón hoặc làm nặng thêm mức độ táo bón đã có trước khi dùng thuốc.
- Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không có chống chỉ định.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Diosmectit có thể hấp phụ một số thuốc khác, do đó có thể ảnh hưởng đến thời gian và tỉ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống Smanetta khoảng 2 - 3 giờ.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

- Triệu chứng: dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc tiêu chảy.
- Xử trí: cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Diosmectit là silicat nhôm và magnesi tự nhiên có cấu trúc trúc từng lớp lá mỏng xếp song song với nhau và có độ quán dẻo cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ đường tiêu hóa.
- Diosmectit tương tác với glycoprotein của niêm dịch bao phủ đường tiêu hóa nên làm tăng tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc đường tiêu hóa khi bị các tác nhân lạ xâm hại. Thuốc có khả năng bám dính và hấp phụ cao tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc tiêu hóa.
- Thuốc có khả năng gắn vào độc tố vi khuẩn ở ruột, nhưng đồng thời cũng có khả năng gắn vào các thuốc khác làm chậm hấp thu hoặc làm mất tác dụng, đặc biệt Tetracyclin và Trimethoprim.
- Diosmectit không cản quang, không làm phân biến màu và với liều thường dùng thuốc không làm thay đổi thời gian chuyển vận sinh lý các chất qua ruột.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Diosmectit không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa và bị thải trừ hoàn toàn qua phân.

TRÌNH BÀY:

Hộp 30 gói.

HẠN DÙNG:

36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

BẢO QUẢN:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN:

TCCS.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẤY THUỐC**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25
SX: 448B Nguyễn Tất Thành - Q.4 - TP.HCM - VN
VP: 120 Hai Bà Trưng - Q.1 - TP.HCM - VN



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Ngày 20 tháng 01 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phan Xuân Kính