

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG



Mẫu toa thuốc
SORBITOL

Trang: 1 / 1
Mã số: NCD.006.00
Số: 14 - 10 - 2011

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

GMP-WHO

Sorbitol

Thuốc bột dùng uống

THÀNH PHẦN: Cho 1 gói thuốc bột dùng uống
Sorbitol.....5g
Tá dược vừa đủ.....1gói
(Tá dược gồm: Vanillin)

Dạng bào chế: Thuốc bột dùng uống

TRÌNH BÀY: Hộp 25 gói, hộp 100 gói x 5g thuốc bột.

CHỈ ĐỊNH: Sorbitol được dùng trong điều trị triệu chứng táo bón và khó tiêu.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Điều trị triệu chứng khó tiêu: Dùng thuốc trước bữa ăn hoặc khi có khó tiêu. Người lớn 1 - 3 gói mỗi ngày.

Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em ½ liều người lớn.

Ghi chú: Pha 1 gói trong ½ cốc nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trong các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại-trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Đối với người bệnh không dung nạp Fructose do di truyền (bệnh chuyển hoá hiếm gặp).

THẬN TRỌNG LÚC DÙNG: Không dùng trong trường hợp tắc đường dẫn mật. Ở người bệnh "dại tràng kích thích" tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều. Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.

Phụ nữ có thai: Không có dữ liệu kiểm soát trong thời kỳ mang thai trên người, cần hỏi ý kiến bác sỹ khi sử dụng sorbitol trong thời kỳ mang thai.

Người cho con bú: Không có dữ liệu về sự bài tiết của sorbitol vào sữa mẹ, nhưng cần thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của những thuốc này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Có thể bị ỉa chảy và đau bụng, đặc biệt ở những người bệnh có "dại tràng kích thích" trường bụng.

Cách xử trí: Ngừng dùng thuốc.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

DƯỢC LỰC HỌC: Sorbitol (D-glucitol) là một rượu có nhiều nhóm hydroxyl, có vị ngọt bằng ½ đường mía (saccharose). Thuốc thúc đẩy sự hydrat - hoá các chất chứa trong ruột. Sorbitol kích thích tiết cholecystokinin-pancreazym và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu. Sorbitol chuyển hoá chủ yếu ở gan thành fructose, một phản ứng được xúc tác bởi sorbitol dehydrogenase. Một số sorbitol có thể chuyển đổi thẳng thành glucose nhờ aldose reductase.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Sorbitol được hấp thụ kém qua đường tiêu hoá, sau khi uống. Một phần rất nhỏ sorbitol không chuyển hoá được đào thải qua thận. Phần còn lại đào thải dưới dạng CO₂ khi thở ra trong quá trình hô hấp.

Quá liều xử trí: Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

THÔNG BÁO CHO BÁC SỸ CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI DÙNG THUỐC.

VPC

PHARMIMEXCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

150 đường 14/9 - Phường 5 - TP Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Email: pharimexco@hcm.vnn.vn, Tel: 0703.823268 - 3822533. Fax: 0703.822129

Cơ sở xin đăng ký

KT. Tổng Giám Đốc

P. Tổng Giám Đốc



Mẫu nhãn hộp
Sorbitol

HỘP 25 GÓI x 5g THUỐC BỘT DỪNG UỐNG

Trang: 1/3
Mã số: MN.09.00
Số: 14 - 10 - 2011

Nhãn trung gian



Trang: 1/4
Mã số: MN.09.00
Số: 14 - 10 - 2011

VFC
pharimexco

Nhãn trung gian



CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
CỬU LONG



Mẫu nhãn gói
SORBITOL
GÓI 5g THUỐC BỘT DÙNG UỐNG

Trang: 1/2
Mã số: MN.09.00
Số: 14 - 10 - 2011

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

THÀNH PHẦN: Cho 1 gói 5g thuốc bột dùng uống
Sorbitol..... 5g
Tá được vừa đủ..... 1 gói

CHỈ ĐỊNH:
Sorbitol được dùng trong điều trị triệu chứng táo bón và khô tiêu.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:
Điều trị triệu chứng khô tiêu: Dùng thuốc trước bữa ăn hoặc khi có khô tiêu.
Người lớn: 1 đến 3 gói mỗi ngày.
Điều trị táo bón: Người lớn: dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng. Trẻ em: ½ liều người lớn. Ghi chú: Pha 1 gói trong ½ cốc nước uống trước bữa ăn 10 phút. Hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C
Để xa tầm tay trẻ em,
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SĐK:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG LÚC DÙNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC.
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150 đường 14/9 - Phường 5 - TP.Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Số lô SX :
Ngày SX :
Hạn dùng:

Sorbitol

gói 5g
Thuốc bột
dùng uống

VPC
PHARIMEXCO

GMP-WHO

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢN LÝ DƯỢC

Cơ sở xin đăng ký
KT. Tổng Giám Đốc
P. Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
TP. VĨNH LONG - T. VĨNH LONG

Th.S. Nguyễn Hữu Trung