

7/11/2

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8 / 11 / 2013

NHÃN GÓI SORBITOL GLOMED

Kích thước:

Dài :: 80 mm

Cao : 60 mm



Thuốc bột uống
Oral powder

Sorbitol Glomed®

Sorbitol 5g

TRIỆU CHỨNG KHÓ TIÊU & TÁO BÓN
DYSPEPSIA & CONSTIPATION

Số lô SX: HD:

COMPOSITION: Each sachet contains Sorbitol 5 grams
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND
OTHER INFORMATION: Please refer to the package insert.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE
STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect
from light.
SPECIFICATION: Manufacturer's.

THÀNH PHẦN: Mỗi gói chứa Sorbitol 5g
CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG
TIN KHÁC VỀ SẢN PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng
ĐỂ XÁC TẮM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SBK/Reg No.:

Sản xuất bởi / Manufactured by:
CTY CP DP GLOMED / GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
35 Đại Lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương.

Ngày 12 tháng 12 năm 2012
P. Tổng Giám Đốc



NHÃN HỘP SORBITOL GLOMED

Kích thước:

Dài : 90 mm

Rộng: 85 mm

Cao : 61 mm

TRIỆU CHỨNG KHÔ TIÊU & TẠO BÓN

Sorbitol 5 g

Sorbitol Glomed®



Hộp 20 gói
Thuốc bột uống

Box of 20 sachets
Oral powder



Sorbitol Glomed®

Sorbitol 5 grams

DYSPEPSIA & CONSTIPATION



Hộp 20 gói
Thuốc bột uống

Sorbitol Glomed®

Sorbitol 5 g

TRIỆU CHỨNG KHÔ TIÊU & TẠO BÓN

COMPOSITION:

Each sachet contains: Sorbitol 5 grams
INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:
Please refer to the package insert.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
STORAGE : Store at the temperature not more than 30°C, in a
dry place, protect from light.

SPECIFICATION : Manufacturer's.

Reg. No.:

Manufactured by:
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.,
35 Tu Do Boulevard, Vietnam - Singapore Industrial Park,
Thuận An, Bình Dương.

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói chứa: Sorbitol 5g
CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SẢN PHẨM:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
BẢO QUẢN:
Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SDK:

Sở nuôi cấy:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đường 15/4 Đà Nẵng công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thuận An, Bình Dương

Số Lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date :
HD / Exp. Date :

Ngày 12 tháng 11 năm 2012

P. Tổng Giám Đốc

Trương Văn Tiến



Trương Văn Tiến

PH DƯỢC



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SORBITOL GLOMED

Sorbitol
Thuốc bột để uống

1- Thành phần

Mỗi gói chứa:

Hoạt chất: Sorbitol 5 g

Tá dược: Tutti frutti flavor (mùi trái cây).

2- Chỉ định

Sorbitol được dùng trong điều trị chứng táo bón và khó tiêu.

3- Liều dùng và cách dùng

Liều dùng

Điều trị triệu chứng khó tiêu: Người lớn: 1 - 3 gói mỗi ngày, dùng trước bữa ăn hoặc khi bị khó tiêu.

Điều trị táo bón:

- Người lớn: 1 gói vào buổi sáng, lúc đói.
- Trẻ em: ½ gói vào buổi sáng, lúc đói.

Sorbitol chỉ được dùng với liều đơn và không dùng thường xuyên trong điều trị táo bón.

Cách dùng

Pha 1 gói trong ½ cốc nước uống trước bữa ăn 10 phút.

4- Chống chỉ định

Bệnh thực thể viêm ruột non, viêm kết tràng - trực tràng.

Bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân không dung nạp fructose do di truyền.

5- Lưu ý và thận trọng

Không nên dùng trong trường hợp tắc đường mật, suy yếu chức năng thận hoặc gan bị hư hại nghiêm trọng.

Ở người bệnh đại tràng kích thích tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều.

Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Trị táo bón bằng sorbitol chỉ hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống thích hợp.

Sử dụng trên phụ nữ có thai và đang cho con bú: Thuốc này không được khuyến cáo dùng trong thai kỳ. Phụ nữ có thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Chưa biết thuốc này có bài tiết trong sữa mẹ hay không. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Sorbitol không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy.

6- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

Mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của những thuốc này.

7- Tác dụng không mong muốn

Đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy, đặc biệt ở những người có bệnh đại tràng kích thích hoặc trướng bụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

8- Quá liều và xử trí

Triệu chứng: Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại.

Xử trí: Bù nước và điện giải nếu cần.

9- Dạng bào chế và đóng gói

Hộp 20 gói, gói 5 gam.

10- Bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

11- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

12- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED

Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0650.768823 Fax: 0650.769094

Ngày 05 tháng 05 năm 2013

P. Tổng giám đốc

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Trang Văn Uy