

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ 1 - NHÃN GÓI SORBITOL 5g (1 gói x 5g thuốc bột)
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27/12/2013

Mặt sau

Mặt trước

CÔNG THỨC:

Sorbitol 5g

CHỈ ĐỊNH- CHỐNG CHỈ ĐỊNH - LIỀU DÙNG

- THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

SDK:

SẢN XUẤT THEO TCCS

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM N.I.C

N.I.C PHARMA

Lô 11D, Đường C, KCN Tân Tạo, TP. HCM, Việt Nam

SORBITOL 5g
THUỐC BỘT GÓI 5g



GMP-WHO

Số lô SX :

HD:

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2012

KT. Tổng Giám Đốc



ĐS. NGUYỄN TRUNG KIÊN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

2 - MẪU HỘP SORBITOL 5g (1 hộp x 20 gói thuốc bột)



Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013
KT. Tổng Giám Đốc



DS. TRẦN THỊ MINH HIỀN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ

3 - MẪU HỘP SORBITOL (1 hộp x 25 gói thuốc bột)



Tp.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2013

KT. Tổng Giám Đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. TRẦN THỊ MINH HIỀN

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc bột SORBITOL

SORBITOL 5g Thuốc bột

♦ **Công thức** (cho 1 gói 5 g thuốc bột)

Sorbitol..... 5 g

♦ **Tác dụng dược lý:**

Dược lực học

- Sorbitol (D-glucitol) là một rượu có nhiều nhóm hydroxyl, có vị ngọt bằng $\frac{1}{2}$ đường mía (sacarose). Thuốc thúc đẩy sự hydrat-hóa các chất chứa trong ruột. Sorbitol kích thích tiết cholecystokinin-pancreazym và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu. Sorbitol chuyển hóa chủ yếu ở gan thành fructose, một phản ứng được xúc tác bởi sorbitol dehydrogenase. Một số sorbitol có thể chuyển đổi thẳng thành glucose nhờ aldose reductase.

Dược động học

- Sorbitol được hấp thu kém qua đường tiêu hóa, sau khi uống hoặc đặt trực tràng. Một phần rất nhỏ sorbitol không chuyển hóa được đào thải qua thận. Phần còn lại đào thải dưới dạng CO_2 khi thở ra trong quá trình hô hấp.

♦ **Chỉ định:**

- Điều trị triệu chứng táo bón.
- Điều trị các triệu chứng rối loạn khó tiêu

♦ **Liều dùng:**

- *Điều trị các triệu chứng khó tiêu:*

- + Người lớn: Uống 1-3 gói / ngày
- + Uống trước bữa ăn hoặc khi khó tiêu

- *Điều trị táo bón:*

- + Người lớn: Uống 1 gói vào buổi sáng, lúc đói
- + Trẻ em: Uống $\frac{1}{2}$ liều người lớn

Cách dùng: Pha 1 gói trong $\frac{1}{2}$ cốc nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

♦ **Chống chỉ định:**

- Viêm ruột non, viêm loét đại – trực tràng, bệnh Crohn, hội chứng tắc hay bán tắc, đau bụng chưa rõ nguyên nhân.
- Người bệnh không dung nạp fructose do di truyền.

♦ **Thận trọng:**

- Trong trường hợp tắc đường dẫn mật.
- Ở người bệnh “đại tràng kích thích” tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều.
- Không nên dùng lâu thuốc nhuận tràng. Trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.

♦ **Tác dụng không mong muốn:**

- Có thể bị tiêu chảy và đau bụng, đặc biệt ở những người có “đại tràng kích thích” hoặc trường bụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

♦ **Tương tác thuốc:**

- Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của các thuốc này.

♦ **Quá liều và xử trí:**

- Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại. Nước và điện giải phải được bù nếu cần.

♦ **Trình bày:**

- Hộp 20 gói x gói 5 g thuốc bột
- Hộp 25 gói x gói 5 g thuốc bột

♦ **Hạn dùng:**

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

♦ **Bảo quản:**

- Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

♦ **Tiêu chuẩn:** TCCS

ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA THẦY THUỐC

KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG GHI TRÊN HỘP

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM NIC (NIC-PHARMA)

Lô 11D đường C – KCN Tân Tạo – Q.Bình Tân – TP.HCM

ĐT : (08) 37.541.999

Fax: (08) 37.543.999

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

Phó Tổng Giám Đốc Chất Lượng



DS. TRẦN THỊ MINH HIỀN

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh