

STIMOL

MALATE de CITRULLINE
CITRULLINE MALATE

18 ampoules
solution buvable en ampoules
oral solution in ampoules

STIMOL

MALATE de CITRULLINE
CITRULLINE MALATE

18 ampoules
solution buvable en ampoules
oral solution in ampoules

BIOCODEX

SA
Zac de Montavas - 13 rue Colbert

STIMOL dung dịch uống đóng ống. Số DK: VN-xxxx-xxx-320 WISSOUS
Citrulline malate 1 g/10 ml. Hộp 18 ống. 353 1 48 463 RCS PARIS
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác. 0363 14 3 463 00048 - APE 514 N
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng. Tel: 01 69 74 1 0 30 - Fax: 01 69 74 90 31
Số lô SX: xxxxx - NSX: xxx/xx/xxxxx - HD: xxx/xxxxxx
Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C
Không được làm: Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nhà sản xuất: Laboratoires BIOCODEX
1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais - PHÁP
DNNKC

BIOCODEX
1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais
FRANCE

24050/01

STIMOL
MALATE de CITRULLINE
CITRULLINE MALATE

ORAL SOLUTION
SOLUTION BUVALE
EN AMPOULES
IN AMPOULES
INDICATION:
STIMOL is an antistressor.
It is used in case of tiredness.
Ce médicament est un antistressor.
Il est utilisé dans le traitement des états de fatigue.
ORAL ROUTE:
VOIE ORALE
NOTE:
STIMOL contains no sugar
and can be used by diabetics.
DOSE:
Refer to the inside leaflet.
MODE OF USE AND WARNINGS:
PRECAUTIONS D'EMPLOI, POSOLOGIE:
NE PAS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
COMPOSITION:
Citrulline malate 1,00 g
Natural orange flavour 0,10 g
concentrated sodium hydroxide solution
pH 7,3
purified water q.s. one ampoule of 10 ml
Store at room temperature.
Specification: Manufacturer:
Specification: fabricant.

18 ampoules
solution buvable en ampoules
oral solution in ampoules

Batch N°:
MFG:
EXP:

CARTOON
design

1 rue firmin boissin
F-31800 toulouse
tél: 432 (0)6 42 47 56 88
www.c-cartoon.com

CUSTOMER: BIOCODEX
PRODUCT: STIMOL
JOB N°: 8929
DATE: 14/10/2007
PROGRAM: 800M TULUSTP
DOC NAME: VETNAM AMP
FORMAT: 16XC CLIENT
PRINT SPECIFICATIONS
PANTONE COLOURS
PANTONE 877 C
ALBERT A CHAUD
HEIS
PANTONE 484 C
CÉLÉSTÉ DE 100 R CM
PANTONE 486 C



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÀ PHÊ DUYỆT
12/06/2014

306/86/6

LABEL ON AMPOULE



TEDIS

Zac de Montavas - 8 bis rue Colbert
91320 WISSOUS
353 148 463 RCS PARIS
Siret 353 148 463 00048 - APE 514 N
Tél. : 01 69 74 90 30 - Fax : 01 69 74 90 31

STIMOL
CITRULLINE MALATE

STIMOL oral solution
Citrulline malate 1 g/10 ml
Do not use for injection
Batch No : EXP:

Laboratoires BIODEX (FRANCE)

M



STIMOL

CITRULLIN MALAT

Dùng dịch uống

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

THÀNH PHẦN

Citrullin malat 1,00 g
Tá dược: hương cam sangria tự nhiên, dung dịch natri hydroxyd 30%, nước tinh khiết cho 1 ống hoặc 1 gói 10 ml.
Hộp 18 ống hay 18 gói.

CHỈ ĐỊNH: Thuốc này được khuyến dùng trong các trường hợp mệt mỏi như:
- trong thời kỳ dưỡng bệnh: sau nhiễm trùng, sau phẫu thuật
- suy nhược ở người lớn tuổi
- vận động viên (giúp tăng cường hoạt động cơ và giảm mỏi cơ sau khi vận động).
Do không có chứa đường trong công thức, STIMOL có thể dùng cho người bị bệnh tiểu đường.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Dùng uống. Cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi.
Người lớn: 3 ống hoặc 3 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.
Trẻ em: 2 ống hoặc 2 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.
Pha loãng thuốc trong ống hoặc gói trong một ly nước.
Thời gian điều trị giới hạn trong 4 tuần.

Cách dùng:

Gói: 1 - Cắm gói thuốc thẳng đứng, sau đó xé hoặc cắt một góc gói thuốc. 2 - Đổ thuốc vào trong ly, dùng các ngón tay ép dọc theo phần thuốc còn lại trong gói. 3 - Pha loãng thuốc với nước có đường hoặc không có.

Ống: Dùng ngón cái và ngón trỏ bẻ 1 trong 2 đầu ống; đặt bên ống đã bẻ lên trên 1 ly và bẻ đầu thứ 2. Pha loãng thuốc với nước có đường hoặc không có đường.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

Trong trường hợp bệnh nhân theo chế độ kiêng muối, cần chú ý mỗi ống hoặc gói chứa khoảng 30 mg muối.
Do pH acid, nên pha loãng thuốc trong gói hoặc ống với một ly nước.
Nếu có nghi ngờ, đừng do dự hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC

Nhằm tránh các tương tác có thể có giữa các thuốc, cần báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết mọi điều trị khác đang theo.

MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Cho đến nay không có báo cáo lâm sàng nào về bất kỳ tác dụng gây dị dạng hoặc độc tính cho bào thai.
Theo nguyên tắc chung, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ thuốc nào trong thời gian có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

STIMOL không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Như mọi thuốc khác, thuốc này có thể gây tác dụng khó chịu ở mức độ khác nhau ở một số người: hiếm có trường hợp nóng rát nhẹ ở dạ dày lúc bắt đầu điều trị.
THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

STIMOL có chứa citrullin malat. Việc cung cấp malat, một thành phần chủ yếu của chu trình Krebs, làm giảm lactat trong máu bằng cách biến đổi chất thải này thành năng lượng và khôi phục quá trình tạo ra năng lượng ATP thông qua chu trình Krebs.

Citrullin là một acid amin tham gia vào chu trình Urê và giúp loại bỏ amonium dư thừa dưới dạng urê.
Citrullin malat được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh huyết tương đạt được trong vòng 45 phút sau khi uống với nồng độ đạt được gấp 6 đến 15 lần so với nồng độ ban đầu. Nồng độ sẽ giảm xuống bằng nồng độ ban đầu sau 5 - 6 giờ. Phức hợp nhanh chóng biến mất khỏi huyết tương trước khi được bài tiết qua nước tiểu.

QUÁ LIỀU: Chưa ghi nhận trường hợp nào quá liều. Tuy nhiên, dùng quá liều có thể làm trầm trọng hơn tác dụng không mong muốn.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá ngày hết hạn dùng ghi ngoài bao bì.

Để xa tầm tay trẻ em. Không được tiêm dạng dung dịch đóng gói trong ống.

NHÀ SẢN XUẤT: BIOCODEX

1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais
PHÁP

TEDIS

Zac de Montavas - 8 bis rue Colbert

91320 WISSOUS

353 148 463 RCS PARIS

Siret 353 148 463 00048 - APE 514 N

Tel. : 01 69 74 90 30 - Fax: 01 69 74 90 31



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Khanh