https://trungtamthuoc.com/



STREPSILS SUGAR FREE LEMON

LOT

EXP

https://trungtamthuoc.com/

169.0 mm

213.0 mm


BENCKISER (THAILAND) LIMITED
VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN
TẠI
T.P HỒ CHÍ MINH





No. 190621 FOIL,STPSL,MY,SF LEMON LID NBS (8355876).pr Rev : 00

https://trungtamthuoc.com/



SEP South East Packaging Industry Co.,Ltd. Tel.023403888 Fax.:023403883	Job No. 190621	Date : 16/08/19	Operator	Signature	Date	Approved / Amend
	Customer : 048 Reckitt		Standard Control			
	Job Title : RB385184 TR1658710_Norm.pdf		Prepress Dept.			
	File Name : 190621FOIL,STPSL,MY,SF LEMON LID NBS (8355876).pr Rev : 00		Customer Approval			
Process Black						

693 HN.

Colours (Foil)

Process Black	Cutter - Does not print	Guides - Does not print
1 OR V		

https://trungtamthuoc.com/



Viên ngậm kháng khuẩn trị đau họng

Strepsils Sugar Free Lemon là viên ngậm kháng khuẩn trị đau họng dành cho người lớn & trẻ em trên 6 tuổi. Ngoài ra sản phẩm này còn thích hợp cho người kiêng đường.

Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định hoặc các thông tin khác: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Each lozenge contains/ Mỗi viên ngậm chứa:	
2,4 - Dichlorobenzyl Alcohol	1.2mg
Amylmetacresol	0.6mg

Bảo quản nhiệt độ dưới 30°C.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Manufactured by/Sản xuất bởi: Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd, 65 Lardkrabang-Bangplee Road, Moo 12, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand (Thái Lan).
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
VN Reg. No./ SĐK: xxxxxx
Imported by/ONNK: xxxxxx

reckitt
www.strepsils.com

24 gói x 6 viên ngậm

Soothing relief for sore throats
Strepsils
Sugar Free
Lemon
Vị chanh không đường
2 hoạt chất kháng khuẩn,
giảm đau họng



24 GÓI X 6 VIÊN NGẬM



24 GÓI X 6 VIÊN NGẬM

Vị chanh không đường
2 hoạt chất kháng khuẩn,
giảm đau họng

Strepsils
Sugar Free
Lemon

Soothing relief for sore throats



LSX. NSX. HSD: xem LOT. MFG. EXP in trên bao bì.

LOT
MFG
EXP

https://trungtamthuoc.com/

Front

Back



BENCKISER (THAILAND) LIMITED
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T.P HỒ CHÍ MINH
RECKITT THAI LAN

TECHNICAL DRAWING

File Name:	S-Sachet-D0262131-6s-BP-94X71mm.a
Description:	Strepsils sachet
Date Drawn:	27/06/2016
Artist:	Julius Maglanoc
REVISION 1	05/07/16
Reason for Revision:	component and 2d code position changed
Artist:	Julius Maglanoc
REVISION 2	04/04/17
Reason for Revision:	Add ink-free area
Artist:	Zhou Jinshen
REVISION 3	00/00/00
Reason for Revision:	Xxxxxxx
Artist:	Xxxxxxx

Key

Cutter | Print to Cut

TRIDENT
Connaught House, Connaught Road,
Kingswood Business Park, Hull, HU7 3AP, England.
T: +44 (0) 1482 828100

https://trungtamthuoc.com/

STREPSILS SUGAR FREE LEMON

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

Thành phần hoạt chất: 2,4 Dichlorobenzyl alcohol 1.2mg; Amylmetacresol 0.6mg
Thành phần tá dược: Lemon Flavour SN400519, Rosemary Oil, Isomalt, Liquid Maltitol, Saccharin sodium, Elderflower Flavour, Tartaric acid, Talcum, Trennwax.

DẠNG BÀO CHẾ

Viên ngậm
Viên ngậm không màu, hình tròn với biểu tượng nhãn hiệu "S" được khắc trên cả 2 mặt

CHỈ ĐỊNH

Có tác dụng kháng khuẩn để làm giảm đau họng và các triệu chứng đau liên quan đến đau họng.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liều dùng:
Dùng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất cần thiết để làm giảm các triệu chứng.
Người lớn:
Một viên sau mỗi 2-3 giờ. Không dùng quá 12 viên trong 24 giờ.
Trẻ em trên 6 tuổi:
Liều giống với người lớn.
Trẻ em dưới 6 tuổi:
Sản phẩm này chống chỉ định ở trẻ em dưới 6 tuổi (xem phần Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).
Người cao tuổi:
Không cần điều chỉnh liều lượng ở người cao tuổi.

Cách dùng:
Dùng đường uống. Ngậm cho tan từ từ trong miệng

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Strepsils Sugar Free Lemon chống chỉ định ở người đã từng quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Không được dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi
Nếu các triệu chứng không được cải thiện hoặc trở nên xấu hơn sau 3 ngày, hoặc nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn hoặc kèm theo sốt cao hoặc đau đầu, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.
Thông tin quan trọng về một số thành phần của thuốc:

https://trungtamthuoc.com/

- Thuốc có chứa isomalt và liquid maltitol, có thể gây hiệu ứng nhuận tràng nhẹ nếu dùng nhiều viên trong một ngày. Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về chứng không dung nạp fructose không nên sử dụng thuốc này.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai:

Không có hoặc dữ liệu hạn chế về việc sử dụng amylmetacresol và 2,4-dichlorbenzyl alcohol.

Như với tất cả các loại thuốc, nên cẩn thận khi sử dụng sản phẩm này trong thai kỳ và tìm tư vấn y tế nếu cần.

Phụ nữ cho con bú:

Chưa rõ 2,4-dichlorobenzyl alcohol, amylmetacresol hoặc các chất chuyển hóa có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Không thể loại trừ rủi ro đối với trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ.

Sản phẩm nên được sử dụng thận trọng trong thời kỳ cho con bú.

Khả năng sinh sản:

Không có dữ liệu về ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của thuốc.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc

Chưa được ghi nhận

Tương kỵ của thuốc:

Không áp dụng

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Danh sách những tác dụng không mong muốn sau đây liên quan đến những tác dụng gặp phải với 2,4-dichlorobenzyl alcohol và amylmetacresol ở liều không kê đơn, khi sử dụng ngắn hạn.

Các tác dụng phụ liên quan đến 2,4-dichlorobenzyl alcohol và amylmetacresol được đưa ra dưới đây, được lập bảng theo phân loại của cơ quan hệ thống và tần suất. Tần suất được định nghĩa là:
Rất thường gặp (≥1/10);
Thường gặp (≥1/100 và <1/10);
Ít gặp (≥1/1000 và <1/100);
Hiếm gặp (≥1/10.000 và <1/1000);
Rất hiếm gặp (<1/10.000);
Không rõ (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn).

Trong mỗi nhóm tần suất, các tác dụng không mong muốn được trình bày theo thứ tự giảm dần mức độ nghiêm trọng.

https://trungtamthuoc.com/

Phân loại theo hệ cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn hệ thống miễn dịch	Chưa rõ	Quá mẫn cảm[ab1]
Rối loạn tiêu hóa	Chưa rõ	Đau lưỡi[ab], khó chịu ở miệng[ab]

[a]2,4-dichlorobenzyl alcohol, [b]amylmetacresol

[1]Phản ứng quá mẫn có thể bao gồm phát ban, mày đay và phù mạch, có thể bao gồm sưng mặt, cổ, họng hoặc lưỡi có thể ảnh hưởng đến việc hô hấp.

Các phản ứng quá mẫn có thể bao gồm phát ban, mề đay và phù mạch, có thể bao gồm sưng mặt, cổ, họng hoặc lưỡi có thể ảnh hưởng đến việc hô hấp

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều

Xét về bản chất và dạng đóng gói của viên ngậm Strepsils Sugar Free Lemon, việc dùng quá liều một cách ngẫu nhiên hoặc cố ý là rất khó xảy ra.

Việc dùng quá liều không gây ra vấn đề gì ngoài sự khó chịu ở đường tiêu hóa.

Xử trí

Điều trị triệu chứng.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Chế phẩm dùng cho họng, thuốc kháng khuẩn; **ATC Code:** R02AA03; Dichlorobenzyl alcohol.

Amylmetacresol và 2,4-Dichlorobenzyl alcohol có đặc tính kháng khuẩn.

Đặc tính dược động học

Chưa có dữ liệu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 24 gói x 6 viên ngậm, Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT

Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.

65 Lardkrabang-Bangplee Road, Moo 12, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thái Lan.