

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12 / 6 / 14

MẪU NHÃN IN TRÊN ỐNG DUNG DỊCH TIÊM
STRYCHNIN SULFAT 1mg/1ml

12

STRYCHNIN SULFAT
tdd 1mg/1ml
GMP - WHO
Số SX:
HD:
CTCPDPTU2 - DOPHARMA



MẪU HỘP 100 ỐNG DUNG DỊCH TIÊM 1ml

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 - DOPHARMA
Sân xuất tại:
9 Trần Thành Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: 04.20474126

STRYCHNIN SULFAT
1mg/1ml

HỘP 100 ỐNG 1ml

(Rx) THUỐC BÁN THEO ĐƠN
DUNG DỊCH TIÊM

HỘP 100 ỐNG 1ml

STRYCHNIN SULFAT
STRYCHNIN SULFAT **1mg/1ml**

TIÊM DƯỚI DA

SDK:
TIÊU CHUẨN : TCCS

DOPHARMA

HỘP 100 ỐNG 1ml
STRYCHNIN SULFAT
STRYCHNIN SULFAT **1mg/1ml**

HẠN DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

NSX :
Số lô SX:
HD :

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Cách dùng: Thêm dưới da theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Liều dùng:

- Liều khuyến cáo đối với người lớn: 1 mg x 2 lần/ngày
- Trong bệnh tê liệt dây thần kinh, phải thêm với liều tăng dần. Bắt đầu với liều 2 mg/ngày, mỗi ngày tăng thêm 1 mg, dần dần có thể lên tới 5 mg/ngày, rồi rút xuống 2 mg mỗi ngày đến liều ban đầu.
- Trẻ em dưới 2 tuổi không được dùng.
- Trẻ em trên 2 tuổi: Dùng theo chỉ định của bác sĩ điều trị.
- Liều tối đa đối với người lớn: 2 mg/lần; 5 mg/ngày
- Không dùng qua liều chỉ định.

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



THUỐC BÁN THEO ĐƠN

GMP - WHO

ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Dùng dịch tiêm

STRYCHNIN SULFAT 1mg/1ml

TRÌNH BÀY: Hộp 10 ống, 100 ống thuốc tiêm 1ml.

CÔNG THỨC:

Strychnin sulfat.....1mg

Acid hydroclorid 1N0,0007 ml

Nước cất pha tiêm vừa đủ.....1ml

DƯỢC LỰC HỌC:

Strychnin sulfat là alcaloid của hạt mã tiền có tác dụng ưu tiên trên tủy sống. Strychnin có tác dụng kích thích phản xạ tủy, tăng dẫn truyền thần kinh cơ, tăng dinh dưỡng và hoạt động cơ nên thường dùng điều trị các trường hợp tê liệt, suy nhược, đái dầm, liệt dương.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Strychnin được hấp thu nhanh chóng sau khi tiêm. Các dấu hiệu bắt đầu xuất hiện trong vòng 15 đến 30 phút, đôi khi xuất hiện chậm sau 1 giờ.

Strychnin di chuyển trong huyết tương và hồng cầu, và nhanh chóng rời khỏi dòng máu, khoảng 50% có thể nhập vào các mô trong vòng 5 phút. Trong một ngộ độc gây tử vong bởi strychnin, strychnin được tìm thấy trong mật, gan và dạ dày. Nửa đời của thuốc trong huyết tương là 10 giờ.

Strychnin dễ dàng được chuyển hóa, chủ yếu bởi các enzyme của microsome gan.

Một vài phút sau khi uống, strychnin được bài tiết không thay đổi trong nước tiểu. Khoảng 10 đến 20% liều sẽ được bài tiết dưới dạng không thay đổi trong nước tiểu sau 24 giờ. Tỷ lệ bài tiết càng giảm khi liều lượng ngày càng tăng. Số lượng bài tiết qua thận, khoảng 70% được đào thải trong 6 giờ đầu, và gần 90% trong 24 giờ đầu tiên, bài tiết gần như hoàn toàn trong vòng 48 đến 72 giờ.

CHỈ ĐỊNH:

Bệnh bại chân tay, bệnh đái dầm.

Liệt thần kinh, bắp thịt mỗi mệt, liệt dương.

Điều trị ngộ độc thuốc ngủ barbituric và kích thích trong trường hợp mô não (nghĩa là strychnin dùng để kích thích trong các trường hợp bị mắc bệnh não glycine. Bệnh não glycine là một khiếm khuyết bẩm sinh trong hệ thống enzyme chịu trách nhiệm cho sự trao đổi chất của glycine. Nó được đặc trưng bởi nồng độ lớn lên của glycine trong huyết tương, dịch não tủy, và nước tiểu. Các triệu chứng của glycine tích tụ bao gồm suy hô hấp, giảm trương lực cơ, co giật, ói mửa, và thờ ơ cùng cực. Hậu quả phổ biến là chậm phát triển tâm thần và tử vong sớm ở trẻ sơ sinh.

Strychnin hoạt động như một chất đối kháng cạnh tranh chọn lọc để ngăn chặn những tác động ức chế của glycine tại các thụ thể glycine, nên có tác dụng kích thích, tác dụng làm giảm các dấu hiệu do sự gia tăng glycine gây nên).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Theo chỉ dẫn của thầy thuốc điều trị.

Cách dùng: Tiêm dưới da theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Liều dùng:

- Liều khuyến cáo đối với người lớn: 1 mg x 2 lần/ngày
- Trong bệnh tê liệt dây thần kinh, phải tiêm với liều tăng dần. Bắt đầu với liều 2 mg/ngày, mỗi ngày tăng thêm 1 mg, dần dần có thể lên tới 5 mg/ngày, rồi rút xuống 2 mg mỗi ngày đến liều ban đầu.
- Trẻ em dưới 2 tuổi không được dùng.
- Trẻ em trên 2 tuổi: Dùng theo chỉ định của bác sĩ điều trị.
- Liều tối đa đối với người lớn: 2 mg/lần; 5 mg/ngày
- Không dùng quá liều chỉ định.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thuốc, cứng động mạch, viêm mạch cấp tính, động kinh, viêm gan, bệnh giết rết (Tetanie), bệnh Basedow, trẻ em dưới 2 tuổi.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT:

Liều cao strychnin làm tăng phản xạ và gây cơn co giật giống như co giật uốn ván.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thuốc tê, barbiturat hoặc cura đối kháng tác dụng gây hưng phấn tủy sống, làm tăng cường kiện cơ của strychnin.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi sử dụng cho người bị cao huyết áp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Run, co giật nhẹ, cứng cơ mặt và chi.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không nên sử dụng Strychnin sulfat cho phụ nữ có thai và cho con bú.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

Liều cao strychnin kích thích cả hành não, vỏ não, làm tăng biên độ và tần số hô hấp, tăng tuần hoàn khi các trung tâm này bị ức chế, kích thích mạnh tủy sống làm tăng phản xạ và gây cơn co giật giống như co giật uốn ván. Cơn co giật do strychnin có tính chất phản xạ, chỉ xuất hiện khi có kích thích từ bên ngoài như tiếng động, ánh sáng... Vì vậy, khi ngộ độc strychnin cần để bệnh nhân vào buồng tối tránh mọi kích thích và dùng các thuốc ức chế cơn co giật như ether, thuốc ngủ.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

TIÊU CHUẨN: TCCS




CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

9 Trần Thánh Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Sản xuất tại:

Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: (04).20474126



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

Giám Đốc



PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐS. Ngô Thị Tuyết Phương