

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2014



Nhân viên:
Số lô SX, NSX, Hạn dùng vì
được dập nổi trên mếp vì

SUPERBRAIN

CITICOLINE 300 mg

COMPOSITION:

Natri citicoline: 313,5 mg
(as 300 mg citicoline base)
Excipients q.s. f11 film coated tablet

INDICATIONS, SIDE EFFECTS,
CONTRA-INDICATIONS,

PRECAUTIONS:

See the package insert.

STORAGE: Store in a dry and cool
place, temperature not exceed 30°C

SPECIFICATION: Manufacture
Keep out of reach of
children.

Read the instructions
carefully before using.

SPK/Reg.No.:

Số lô SX/Lot.No.:

NSX/Mfg.Date:

HD/Exp.Date:

Rx Prescription drug

SUPERBRAIN

CITICOLINE 300 mg

NEURO - ACTION ENHANCER

GMP- WHO

Box of 5 Alu- alu
4 film coated tablets



Distributor:
HUNGVIETPHARMA

SUPERBRAIN

CITICOLINE 300 mg

THÀNH PHẦN:

Natri citicoline: 313,5 mg
(tương ứng 300 mg citicoline base)
Tá dược vđ: 1 viên

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU
DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem
trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát,
nhiệt độ không quá 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW3
16 Lê Đại Hành- Hải Phòng

Nhà máy SX Nam Sơn- An Dương- Hải Phòng

Nhà phân phối:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DƯỢC PHẨM
HUNG VIỆT
Lô 4B M2 KĐT Yên Hòa Trung Yên Cầu Giấy HN
ĐT: 043.7821781

Rx Thuốc bán theo đơn

SUPERBRAIN

CITICOLINE 300 mg

PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG THẦN KINH

GMP- WHO

Hộp 5 vỉ Alu- alu
4 viên nén bao phim



Nhà phân phối:
HUNGVIETPHARMA

Mẫu đơn hướng dẫn sử dụng:

R_x Thuốc bán theo đơn

GMP- WHO

SUPERBRAIN

Citicoline 300 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên.

Công thức: Tính cho 1 viên thành phẩm:

Natri citicoline.....313,5 mg (tương ứng 300 mg citicolin base)

Tá dược vừa đủ.....1 viên

(Tá dược gồm: Tinh bột ngô, Avicel, PVP, DST, Magnesi stearat, Talc, HPMC, Propylen glycol, Titan dioxyd)

Đặc tính dược lực học: Citicoline là chất trung gian sinh học của sự tổng hợp các lipid, là tiền chất của sự tổng hợp lecithin, mà lecithin là một trong những thành phần chủ yếu của màng tế bào và của các bào quan. Vai trò của lecithin trong sự tái tạo tế bào cho thấy dùng Citicoline có tác dụng được lý lên hệ thần kinh trung ương, bảo vệ hệ thần kinh trung ương chống nhiều chất độc hại (thiếu oxy, các dung môi hữu cơ độc với thần kinh...). Đã thấy có sự tương quan giữa sự tổn hại của não với các rối loạn chức năng thần kinh và sự thiếu hụt phospholipid ở những vùng bị bệnh. Sự tái tạo phospholipid đòi hỏi sự sáp nhập của cholin vào phosphatidylcholin, là quá trình cần thực hiện qua citicoline. Vì vậy dùng citicoline điều trị các rối loạn chức năng thần kinh khi tuổi cao (choáng vàng, đau nửa đầu, mệt mỏi, mất ngủ, giảm sút trí nhớ, giảm thể lực, rối loạn tư thế và các rối loạn chức năng giao tiếp xã hội), tổn hại não sau phẫu thuật và các hiện tượng huyết khối mạch máu não.

Đặc tính dược động học: Sau khi uống Citicoline bị thủy phân ở ruột non, cho 2 thành phần (cholin và citidin) và sẽ hấp thu nhanh. Một phần sẽ tái tổng hợp tại gan. Chỉ có 3% được đào thải qua nước tiểu và phân.

Chỉ định

- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não
- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

Liều dùng: Liều thường dùng: Uống 2 - 4 viên/ngày

- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não: 2 viên/lần, 1-2 lần/ngày
- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng: 2 viên/lần/ngày trong 3-4 tuần

Tác dụng không mong muốn: Trong một số trường hợp có rối loạn nhẹ ở ống tiêu hoá (buồn nôn, nôn, rối loạn thượng vị, tiêu chảy), mệt mỏi, nhức đầu, kích động. Thỉnh thoảng có thể gặp hạ huyết áp kèm nhịp tim chậm hoặc nhịp tim nhanh.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc: Không phối hợp Superbrain với meclofenoxate hoặc centrofenoxine. Do citicoline làm tăng hiệu lực của levodopa nên cần thận trọng khi phối hợp 2 loại thuốc này.

Thận trọng: Citicoline không làm hạ huyết áp kéo dài nên không thể thay thế được các thuốc chống tăng huyết áp. Sau chấn thương, sau phẫu thuật, nên phối hợp cầm máu giảm áp lực nội sọ. Chưa rõ ảnh hưởng do tích lũy thuốc trong cơ thể hoặc do nghiện thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có đầy đủ dữ liệu về sử dụng thuốc này trong thời kỳ có thai và cho con bú

Quá liều và xử trí: Đến nay chưa có báo cáo gì về quá liều. Trong trường hợp uống quá liều nghiêm trọng (do cố ý hoặc vô ý) thì cần điều trị triệu chứng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn thuốc.

Bảo quản: Để nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS/031- Z3 - 05 - 12

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
16 Lê Đại Hành - Hải Phòng
Nhà máy SX: Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: (031)3747507/ Fax: (031)3823125.

Phân phối độc quyền

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HUNG VIỆT
Phòng 10- A1 - TT Bắc Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04.37821780