



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TAURINE- Solopharm 4%

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch nhãn khoa (Không dùng chất bảo quản)

THÀNH PHẦN:

Mỗi ml dung dịch Taurine - Solopharm 4% chứa: Taurine 40mg.

Nước cất pha vừa đủ 1 ống đơn liều 1ml hay ống đơn liều 0,4ml.

TÍNH CHẤT:

- Taurine là một acid amin chứa lưu huỳnh được hình thành trong cơ thể trong quá trình chuyển hóa cysteine.
- Taurine có tác dụng kích thích quá trình phục hồi và tái tạo biểu mô tế bào trong các bệnh loạn dưỡng cũng như quá trình loại bỏ sự rối loạn chuyển hóa của tế bào mắt, nó thúc đẩy bình thường hóa chức năng của màng tế bào, kích thích năng lượng và trao đổi chất duy trì thành phần điện giải trong dịch tế bào do sự tích lũy của ion K^+ và Ca^{2+} .

CÔNG DỤNG:

- Dung dịch Taurine 4% được sử dụng trong điều trị bệnh nhân khi bị loạn dưỡng giác mạc; viêm giác mạc, bệnh suy yếu và chấn thương mắt, đục thủy tinh thể (do tuổi già, bệnh tiểu đường, chấn thương, bức xạ); chấn thương giác mạc, viêm giác mạc (như là một chất kích thích các quá trình phục hồi do tổn thương giác mạc, bệnh nhân mổ mổ, tái tạo biểu mô giác mạc trong viêm loét giác mạc cũng như loại bỏ sự rối loạn chuyển hóa của tế bào mắt, bình thường hóa chức năng màng tế bào, tối ưu hóa các quá trình tạo năng lượng và trao đổi chất); biểu hiện đầu tiên của bệnh tăng nhãn

áp (kết hợp với β -blockers để cải thiện dòng chảy của dịch chất lỏng trong nhãn cầu). Phòng và phối hợp điều trị bệnh cận thị, khô mắt, làm giảm các triệu chứng khô mắt, nóng rát, mỏi mắt do khói bụi, máy điều hòa nhiệt độ, sử dụng máy tính, điện thoại trong thời gian dài, những người thường xuyên đeo kính áp tròng.

CẢNH BÁO:

- Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng phụ nếu có khi sử dụng dung dịch Taurine - Solopharm 4%.
- Nếu cần thiết sử dụng đồng thời các thuốc nhỏ mắt khác, khoảng thời gian giữa dung dịch Taurine và các loại thuốc khác nên cách nhau ít nhất 10 - 15 phút.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Dung dịch Taurine - Solopharm 4% được sử dụng dưới hình thức nhỏ tại chỗ.
- Trường hợp bị cận thị hoặc dự phòng chứng cận thị nên dùng dung dịch Taurine - Solopharm 4% nhỏ 1 - 2 giọt vào mỗi mắt, 2 - 4 lần mỗi ngày, trong vòng 3 tháng. Đợt điều trị lặp lại sau 1 tháng.
- Bệnh đục thủy tinh thể, dung dịch Taurine - Solopharm 4% được dùng như sau: nhỏ 1 - 2 giọt vào mỗi mắt, 2 - 4 lần mỗi ngày, trong vòng 3 tháng. Đợt điều trị lặp lại sau 1 tháng.
- Bệnh viêm giác mạc và loạn dưỡng giác mạc được sử dụng ở liều tương tự như trên trong 1 tháng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể hơi khó chịu tạm thời khi sử dụng dung dịch.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp: 20 ống nhựa đơn liều 0,4ml hoặc 1ml.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN :

- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C
- Để xa tầm tay trẻ em

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 03 năm (kể từ ngày sản xuất).

NHÀ SẢN XUẤT:

LLC "Grotex Ltd" - Russia.

195.279, St Peterburg, đường Công nghiệp, nhà số 71, tòa 2A - LB Nga.

NHÀ NHẬP KHẨU:

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Thực phẩm Ilife

Địa chỉ: B26 - Lô 19 - ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SẢN PHẨM

- Dùng tay vệ sinh sạch, tách ống dung dịch, cầm phần nắp ống xoay sao cho nắp đứt khỏi thân lọ.

Nhỏ dung dịch vào trong túi giác mạc, nhẹ nhàng bóp ống nhỏ giọt, chớp mắt vài lần để dung dịch tràn đều trên võng mạc của mắt.

- Tuyệt đối không dùng dao, kéo để cắt đầu ống dung dịch vì có thể gây nhiễm khuẩn.

