

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/6/2013 llll

# Hộp Tobradico

Kích thước hộp: 28 x 28 x 67 mm

HDSD: 80 x 160 mm

Nhãn: 63 x 18 mm

Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tên: TCSS  
SDK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HSD:

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Khoa  
**Trường Đại học Dược Hà Nội**  
ĐC: 13-15 Lê Thanh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Nhà phân phối: Công ty Cổ phần Dược HADICO  
ĐC: 22, Lô 12 KĐT M Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội

**Thuốc nhỏ mắt**  
**Tobradico**  
Rx Thuốc bán theo đơn

**Thành phần**  
Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfate) ..... 15mg  
**Tà dược:** Acid boric, Natri borate, Natri chloride, Benzalkonium chloride, Natri edetat, Nước cất vừa đủ ..... 5ml  
**Dạng bào chế:** Dung dịch thuốc nhỏ mắt.  
**Chỉ định, Liều dùng và Cách dùng:** Xem chỉ định, Theo trong, Các thông tin khác. Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng.  
**Chú ý:** Nơi khô mắt, ở trong bao bì kín, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C  
Lọ thuốc đã mở nắp không dùng quá 15 ngày

5mg GMP - WHO

**Thành phần**  
Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfate) ..... 15mg  
**Tà dược:** Acid boric, Natri borate, Natri chloride, Benzalkonium chloride, Natri edetat, Nước cất vừa đủ ..... 5ml  
**Dạng bào chế:** Dung dịch thuốc nhỏ mắt.  
**Quy cách đóng gói:** Hộp 01 lọ 5ml  
**Liều dùng Cách dùng**  
Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.  
Liều dùng cho người lớn và trẻ em:  
- Với các nhiễm khuẩn nhẹ và vừa: Nhỏ 1-2 giọt vào mỗi bên mắt sau mỗi 4 giờ.  
- Với các nhiễm khuẩn nặng: Nhỏ 2 giọt vào mỗi bên mắt sau mỗi giờ cho đến khi triệu chứng được cải thiện.  
Có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo triệu chứng bệnh.  
Thời gian sử dụng không quá 7 ngày.

Nhà phân phối:  
**Công Ty Cổ phần Dược HADICO**  
ĐC: 22 C Lô 12 KĐT M Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội  
ĐT: 043.6400.549 | Fax: 043.6400.548  
Nhà sản xuất:  
Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Khoa  
**Trường Đại học Dược Hà Nội**  
ĐC: 13-15 Lê Thanh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
ĐT: +84 4 3933 5956 | Fax: +84 4 3933 2607

GMP - WHO  
Rx Thuốc bán theo đơn

**Thuốc nhỏ mắt**  
**Tobradico**

5mg

**Chỉ định, chống chỉ định, thận trọng và các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.  
**Bảo quản**  
Nơi khô mát, ở trong bao bì kín, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C  
Lọ thuốc đã mở nắp không dùng quá 15 ngày

Để xa tầm tay của trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

**Chú ý: KHÔNG ĐƯỢC UỐNG**

**Tiêu chuẩn: TCSS**  
**SDK:**  
**Số lô SX:**  
**NSX:**  
**HSD:**

Nhà phân phối:  
**Công Ty Cổ phần Dược HADICO**  
ĐC: 22 C Lô 12 KĐT M Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội  
ĐT: 043.6400.549 | Fax: 043.6400.548  
Nhà sản xuất:  
Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Khoa  
**Trường Đại học Dược Hà Nội**  
ĐC: 13-15 Lê Thanh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
ĐT: +84 4 3933 5956 | Fax: +84 4 3933 2607

5mg

**Thuốc nhỏ mắt**  
**Tobradico**  
Rx Thuốc bán theo đơn

GMP - WHO  
Rx Thuốc bán theo đơn

**Thuốc nhỏ mắt**  
**Tobradico**

5mg

M.S.D.N.010... C.T. TNHH  
**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI**  
ĐC: 13-15 LÊ THANH TÔNG, PHAN CHU TRINH, HOÀN KIẾM, TP. HÀ NỘI  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
DS. Nguyễn Trường Giang

# Thuốc nhỏ mắt Tobradico

Rx Thuốc bán theo đơn

**Thành phần:** Cho 01 lọ 5ml:

Tobramycin..... 15mg

**Tá dược:** Acid boric, Natri borate, Natri chloride, Benzalkonium chloride, Natri edetat, Nước cất vừa đủ..... 5ml

**Dạng bào chế:** Dung dịch thuốc nhỏ mắt.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 01 lọ 5ml.

### Tác dụng:

Tobramycin là một kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid.

Phổ kháng khuẩn của Tobramycin như sau:

Các chủng vi khuẩn nhạy cảm: *Staphylococci*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Enterobacter*, *Proteus morgani*, *Haemophilus aegypticus* (Koch-Weeks), *Acinetobater calcoacetius*, *Neisseria*, *Salmonella*, *Shigela*, *Serraria*.

**Các đặc tính được động học:** Chưa có báo cáo

### Chỉ định:

Điều trị tại chỗ cho những nhiễm trùng ở những cấu trúc ngoài của mắt và vùng phụ cận do những nhiễm khuẩn nhạy cảm với Tobramycin: Viêm mí mắt, viêm túi lệ, viêm màng kết, viêm giác mạc.

Phòng ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật mắt.

### Liều dùng - Cách dùng:

Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Liều dùng cho người lớn và trẻ em:

- Với các nhiễm khuẩn nhẹ và vừa: Nhỏ 1 - 2 giọt vào mỗi bên mắt sau mỗi 4 giờ.

- Với các nhiễm khuẩn nặng: Nhỏ 2 giọt vào mỗi bên mắt sau mỗi giờ cho đến khi triệu chứng được cải thiện.

Có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo triệu chứng bệnh.

Thời gian sử dụng không quá 7 ngày.

### Chống chỉ định:

Bệnh nhân dị ứng với tobramycin hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng khi dùng thuốc.

Thận trọng với người thiếu năng thận từ trước, bị rối loạn tiến đình, bị thiếu năng ở ốc tai, sau phẫu thuật và các điều kiện khác làm giảm dẫn truyền thần kinh cơ.

Như các chế phẩm kháng sinh khác, sử dụng lâu dài có thể gây ra bội nhiễm các chủng vi sinh vật không nhạy cảm, đặc biệt là nhiễm nấm. Nếu xảy ra bội nhiễm, nên lựa chọn phương pháp điều trị khác thích hợp hơn.

### Tương tác thuốc:

Tăng độc tính của các aminoglycosid khi sử dụng đồng thời các chất gây độc với cơ quan thính giác và thận.

### Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có thông tin đầy đủ về việc sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai. Do đó chỉ dùng khi thực sự cần thiết.

Có thể có nguy cơ gây tác dụng phụ cho trẻ đang bú mẹ, vì vậy phải cân nhắc giữa việc ngừng sử dụng thuốc hay ngừng cho con bú.

### Lái xe và vận hành máy móc:

Cũng giống như với các thuốc nhỏ mắt khác, nhìn mờ tạm thời hoặc những rối loạn về thị lực có thể ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc. Nếu bị nhìn mờ khi nhỏ mắt, bệnh nhân cần chờ cho tới khi nhìn rõ lại rồi mới được phép tiếp tục lái xe và vận hành máy móc.

### Tác dụng không mong muốn:

Dùng dung dịch thuốc nhỏ mắt tobramycin thường dung nạp tốt.

Nếu có triệu chứng ngứa mắt, phù mí mắt và viêm màng kết đỏ mắt... sau khi dùng thuốc cần ngưng sử dụng thuốc ngay.

### Quá liều và cách xử trí:

Triệu chứng tương tự như khi gặp tác dụng phụ của thuốc. Cần giảm liều hoặc ngưng thuốc nếu cần thiết.

### Bảo quản:

Nơi khô mát, ở trong bao bì kín, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C

Lọ thuốc đã mở nắp không dùng quá 15 ngày

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lọ thuốc đã mở nắp không sử dụng quá 15 ngày.

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**SDK:**

**Số lô SX:**

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRÉ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA THẦY THUỐC

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI**

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông - Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: +84 4 3933 5956

Fax: +84 4 393 32607

Nhà phân phối: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADICO**

Địa chỉ: 22C Lô 12 KĐT M Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: +84 4 3640 0549

Fax: +84 4 3640 0548



  
  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
**Nguyễn Văn Thanh**

  
  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Trường Giang**