

Tonimide

Carduus marianus extract 200 mg

COMPOSITION:
Each soft capsule contains:
Cardous marianus extract.....200 mg
(equivalent to Silybin 60mg/Silymarin 100mg)

INDICATIONS:

Support treatment in following diseases:

- Impaired hepatic function.
- Acute hepatitis, chronic hepatitis.
- Cirrhosis, adiposis hepatica.
- Protecting liver cells from toxic agents as: wine, tobacco, antibiotics,...
- Digestive disorders related to liver cell function.

ADMINISTRATION & CONTRAINDICATION:
See insert paper.

STORAGE:
In a tight container, dry and cool place,
protect from light, below 30°C

PACKAGE: 12 blisters x 5 soft capsules/box

PHIL PHIL INTER PHARMA
INTER PHARMA

WHO-GMP

60 viên nang mềm

Tonimide

Cao Carduus marianus 200 mg

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa
Cao *Carduus marianus*.....200 mg
(tương đương với Silybin 60mg, Silymarin 100mg)

CHỈ ĐỊNH:

- Suy giảm chức năng gan.
- Viêm gan cấp tính, viêm gan mãn tính.
- Xơ gan, gan nhiễm mỡ.
- Bảo vệ tế bào gan khỏi các chất độc hại như rượu, thuốc lá, thuốc kháng sinh.
- Các chứng rối loạn tiêu hóa có liên quan đến chức năng tế bào gan.

CÁCH DÙNG & CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C

ĐÓNG GÓI: 12 vỉ x 5 viên nang mềm/hộp

Sản xuất tại:
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, KCN Việt Nam-
Singapore, Bình Dương

SDK:
Số lđ SX:
NSX:
HD:

TP. ~~ĐÀ NẴNG~~ CHẤT LƯỢNG

TP. ĐÀ NẴNG CHÂU Đ. T. N. G. S. C. P. 463023000233-D. T. N. G. CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA H. H. THUAN AN T. BINH DUONG TP. ĐÀ NẴNG CHÂU Đ. T. N. G.

CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ KÝ

1




Lan dau: 42/ 5/ 2014

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

MẪU NHÃN VỈ

Sản phẩm : Nang mềm **Tonimide**
Kích thước vỉ : 38 x 100 mm
Tỷ lệ : 70%
Nội dung : như mẫu



Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập nổi trên vỉ



Để xa tâm tay trẻ em
Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ



TONIMIDE

SĐK:

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

Hoạt chất: Cao Carduus marianus..... 200 mg
(tương đương với Silybin 60mg, Silymarin 100mg)

Tá dược: Dầu đậu nành, dầu đậu nành hydrogen hóa 1 phần, dầu lecithin, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, màu vàng số 4, màu vàng số 5, màu đỏ số 40, màu xanh số 1, titan dioxyd, nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang mềm

CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp sau:

- Suy giảm chức năng gan.
- Viêm gan cấp tính, viêm gan mãn tính.
- Xơ gan, gan nhiễm mỡ.
- Bảo vệ tế bào gan khỏi các chất độc hại như: rượu, thuốc lá, thuốc kháng sinh,...
- Các chứng rối loạn tiêu hóa có liên quan đến chức năng tế bào gan.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Dùng thuốc theo đường uống.

Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên x 3 lần/ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tuổi tác và triệu chứng bệnh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không dùng cho bệnh nhân vàng da tắc mật và xơ gan ứ mật tiên phát.

THẬN TRỌNG

Silymarin trong cao Carduus marianus còn có tác dụng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Một số nghiên cứu đã cho thấy hoạt chất Silymarin trong cao Carduus marianus có tác dụng ức chế lên enzyme Cytochrome P450 ở gan. Do đó khi dùng đồng thời với các thuốc chuyển hóa qua Cytochrome P450 như: amitriptyline, celecoxib, diclofenac, tolbutamide... nồng độ các thuốc dùng cùng sẽ tăng lên. Vì vậy, cần giám sát chặt chẽ và điều chỉnh liều trong trường hợp cần thiết.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có nghiên cứu khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có tài liệu chứng minh thuốc ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng không mong muốn có thể gặp phải: đau dạ dày, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn, hiếm khi xảy ra phản ứng dị ứng.

** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

QUÁ LIỀU: Chưa có báo cáo về việc dùng thuốc quá liều.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong hộp kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

ĐÓNG GÓI: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

