

MẪU THIẾT KẾ HỘP VÀ NHÃN VỈ VIÊN NÉN BAO PHIM TRAFILON - 500
(Hộp 3 vỉ x 12 viên nén bao phim)

Traphaco

Hộp 3 vỉ x 12 viên nén bao phim

Trafilon - 500

WHO-GMP

Traphaco

Hộp 3 vỉ x 12 viên nén bao phim

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)	500 mg
(tương ứng Diosmin)	450 mg
Hesperidin	50 mg
Tá dược	vừa đủ

TÁC DỤNG:
Thuốc tác động trên hệ thống tĩnh mạch bằng cách:

- Trên tĩnh mạch: làm giảm sức căng và tình trạng ứ trệ của tĩnh mạch.
- Trên tuần hoàn vi mạch: giúp bình thường hóa tính thấm mao mạch và tăng sức bền mao mạch.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Liều dùng:**
Liều thông thường: 2 viên/ngày, 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối, uống vào bữa ăn.
Trị cấp: 4 ngày đầu: 6 viên/ngày; 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày.
Thẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của Trafilon - 500 ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.
- Cách dùng:**
Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng).

Traphaco

Hộp 3 vỉ x 12 viên nén bao phim

Trafilon - 500

WHO-GMP

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng liên quan đến suy giảm tĩnh mạch bạch huyết (*nặng chân, đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày*).
- Điều trị triệu chứng liên quan đến trĩ cấp.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Vị trí in mã số mã vạch

Để xa tầm tay trẻ em
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:
Lô SX:
NSX:
HD:

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Trafilon - 500

Viên nén bao phim

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)

(tương ứng Diosmin)

Hesperidin

Traphaco

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Viên nén bao phim

Trafilon - 500

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

Traphaco

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Viên nén bao phim

Trafilon - 500

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)

(tương ứng Diosmin)

Hesperidin

Traphaco

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Viên nén bao phim

Trafilon - 500

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

Lô SX:
HD:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

MẪU NHÃN VỈ - Lô SX, HD: đập nổi trên vỉ

Người trình bày: *Thúy*
Người kiểm tra: *Hằng*
Ngày kiểm tra: 15/09/2023

MẪU THIẾT KẾ HỘP VÀ NHÃN VỈ VIÊN NÉN BAO PHIM TRAFILON - 500
(Hộp 5 vỉ x 12 viên)



THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)	500 mg
(tương ứng Diosmin.....	450 mg
Hesperidin.....	50 mg)
Tá dược.....	vừa đủ

C. DUNG*

Thuốc tác động trên hệ thống tinh mạch bằng cách:

- **Trên tinh mạch:** làm giảm sức căng và tinh trạng ứ trệ của tinh mạch.
- **Trên tuần hoàn vi mạch:** giúp bình thường hóa tinh thấm mao mạch và tăng sức bền mao mạch.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Liều dùng:

Liều thông thường: 2 viên/ngày, 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối, uống vào bữa ăn.

Tri cấp: 4 ngày đầu: 6 viên/ngày; 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày.

Trẻ em: Tính c

em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.

- Cách dùng:

Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)



CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng liên quan đến suy giảm tình mạch bạch huyết (*nặng chân, đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày*).

- Điều trị triệu chứng liên quan đến trí cấp

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Vị trí in
mã số mã vạch

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:

Lô SX:

NSY-

NSA
HD


Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



MẪU NHÂN VỊ - Lô SX, HD: *dập nổi trên vị*

Người trình bày: *Thúy*
 Người kiểm tra: *Hằng*
 Ngày kiểm tra: 15/09/2023

MẪU THIẾT KẾ HỘP VÀ NHÃN VỈ VIÊN NÉN BAO PHIM TRAFILON - 500
(Hộp 10 vỉ x 12 viên)



THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa

Diosmin ; Hesperidin (9 : 1)	500 mg
(tương ứng Diosmin).....	450 mg
Hesperidin.....	50 mg)
Tá dược.....	vừa đủ

TÁC DỤNG:

Thuốc tác động trên hệ thống tinh mạch bằng cách:

- *Trên tinh mạch:* làm giảm sức căng và tình trạng ứ trệ của tinh mạch.
- *Trên tuần hoàn vi mạch:* giúp bình thường hóa tình trạng thấm mao mạch và tăng sức bền mao mạch.

LIỆU DỤNG - CÁCH DÙNG

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- **Liều dùng:**
Liều thông thường: 2 viên/ngày, 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối, uống vào bữa ăn.
Tỉ lệ cao: 4 ngày đầu: 6 viên/ngày; 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày.
- **Trẻ em:** Tính an toàn và hiệu quả của Tracton - 500 ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.
- **Cách dùng:**
Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

Hội đồng nhân dân xã



- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ GIẢM TÍNH MẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

WHO-GMP

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng liên quan đến suy giảm tình mạch bạch huyết (nặng chân, đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày).
- Điều trị triệu chứng liên quan đến trí cấp.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Vị trí in
mã số mã vạch


ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:
 LỖ SX:
 NSX:
 HD:

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HÙNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



MẪU NHÃN VỈ - Lô SX, HD: dập nổi trên vỉ

Người trình bày: *Thúy*
 Người kiểm tra: *Hằng*
 Ngày kiểm tra: 15/09/2023

MẪU THIẾT KẾ HỘP VÀ NHÃN VỈ VIÊN NÉN BAO PHIM TRAFILON - 500
(Hộp 2 vỉ x 15 viên)

Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim	WHO-GMP CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TRAFILON - 500 Điều trị: • CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT • TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP Traphaco Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim	
	THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa: Diosmin : Hesperidin (9 : 1)500 mg (tương ứng Diosmin.....450 mg Hesperidin.....50 mg) Tá được.....vừa đủ CHỈ ĐỊNH: - Điều trị các triệu chứng liên quan đến suy giảm tính mạch bạch huyết (nặng chân, đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày). - Điều trị triệu chứng liên quan đến trí cấp. LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: - Liều dùng: Liều thông thường: 2 viên/ngày. 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối, uống vào bữa ăn. Trí cấp: 4 ngày đầu: 6 viên/ngày; 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày. Trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của Trafilon - 500 ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập. - Cách dùng: Dùng đường uống.	
Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim	Traphaco Điều trị: • CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT • TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP TRAFILON - 500 WHO-GMP	Vị trí in mã số mã vạch ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: (Xem tờ hướng dẫn sử dụng). BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Điện thoại liên hệ: 18006612 Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên TIÊU CHUẨN: TCCS SDK: Lô SX: NSX: HD:		

Viên nén bao phim TRAFILON - 500 Diosmin : Hesperidin (9 : 1)500 mg (tương ứng Diosmin.....450 mg Hesperidin.....50 mg) Traphaco Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN Viên nén bao phim TRAFILON - 500 Điều trị: • CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT • TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP Traphaco Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN Viên nén bao phim TRAFILON - 500 Diosmin : Hesperidin (9 : 1)500 mg (tương ứng Diosmin.....450 mg Hesperidin.....50 mg) Traphaco Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN Viên nén bao phim TRAFILON - 500 Điều trị: • CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT • TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP Traphaco Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN	Lô SX: HD: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN
---	--

MẪU NHÃN VỈ - Lô SX, HD: dập nổi trên vỉ

Người trình bày: Thúy
Người kiểm tra: Hằng
Ngày kiểm tra: 15/09/2023

MẪU THIẾT KẾ HỘP VÀ NHÃN VỈ VIÊN NÉN BAO PHIM TRAFILON - 500
(Hộp 4 vỉ x 15 viên)

Traphaco

Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim

WHO-GMP

Traflon - 500

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

Traphaco

Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)500 mg

(tương ứng Diosmin.....450 mg

Hesperidin.....50 mg)

Tó được.....vừa đủ

TÁC DỤNG:

Thuốc tác động trên hệ thống tĩnh mạch bằng cách:

- Trên tĩnh mạch: làm giảm sức căng và tình trạng ú trệ của tĩnh mạch.
- Trên tuần hoàn vi mạch: giúp bình thường hóa tính thấm mao mạch và tăng sức bền mao mạch.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Liều dùng:

Liều thông thường: 2 viên/ngày, 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối, uống vào bữa ăn.

Trí cấp: 4 ngày đầu: 6 viên/ngày; 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày.

Trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của Traflon - 500 ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.

- Cách dùng:

Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

(Xem tờ hướng dẫn sử dụng).

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

WHO-GMP

Traflon - 500

Chỉ định:

- Điều trị các triệu chứng liên quan đến suy giảm tính mạch bạch huyết (nặng chân, đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày).
- Điều trị triệu chứng liên quan đến trí cấp.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN:

TCCS

Vị trí in mã số mã vạch

Để xa tầm tay trẻ em

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Viên nén bao phim

Traflon - 500

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)500 mg

(tương ứng Diosmin.....450 mg

Hesperidin.....50 mg)

Traphaco

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Viên nén bao phim

Traflon - 500

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

Traphaco

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Viên nén bao phim

Traflon - 500

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

Traphaco

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Viên nén bao phim

Traflon - 500

Điều trị:

- CÁC TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN SUY GIẢM TÍNH MẠCH BẠCH HUYẾT
- TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ CẤP

Lô SX:

HD:

CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

MẪU NHÃN VỈ - Lô SX, HD: dập nổi trên vỉ

Người trình bày: *Thùy*
Người kiểm tra: *Hằng*
Ngày kiểm tra: 15/09/2023

MẪU THIẾT KẾ HỘ VÀ NHÃN VỈ VIÊN NÉN BAO PHIM TRAFILON - 500
(Hộp 8 vỉ x 15 viên)



THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)	500 mg
(tương ứng Diosmin)	450 mg
Hesperidin	50 mg)
Tá dược	vũu đĩ

TÁC DỤNG:

Thuốc tác động trên hệ thống tinh mạch bằng cách:

- *Trên tinh mạch:* làm giảm sức căng và tình trạng ứ trệ của tinh mạch.
- *Trên tuần hoàn vi mạch:* giúp bình thường hóa tính thấm mao mạch và tăng sức bền mao mạch.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Lưu ý:
Lưu ý thông thường: 2 viên/ngày, 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối, uống vào bữa ăn.
Trị cấp: 4 ngày đầu: 4 viên/ngày; 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày.

Trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của Trafalon - 500 ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.

- Cách dùng:
Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)



CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng liên quan đến suy giảm tình mạch bạch huyết (nặng chân, đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày).
- Điều trị triệu chứng liên quan đến trĩ cấp.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Vị trí in
mã số mã vạch

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK

Lô SX:

NSX:

HD:


Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



MẪU NHÃN VỈ - Lô SX, HD: dập nổi trên vỉ

Người trình bày: *Thúy*
 Người kiểm tra: *Hằng*
 Ngày kiểm tra: 15/09/2023

Tờ hướng dẫn sử dụng



**Viên nén bao phim
TRAFLON - 500**

***Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng***

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: - Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 12 viên.
- Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 8 vỉ x 15 viên.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim

Mô tả: Viên nén bao phim, màu nâu nhạt, hai mặt trơn.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Thành phần hoạt chất:

Diosmin : Hesperidin (9 : 1)	500 mg
(tương ứng Diosmin	450 mg
Hesperidin	50 mg)

Thành phần tá dược:

Lactose, Microcrystalline cellulose, Natri lauryl sulfat,	Vừa đủ
Povidone, Sodium starch glycolate, Magnesi stearat, Talc,	
HPMC, PEG 6000, Oxyd sắt đỏ, Oxyd sắt vàng, Titan dioxyd	

TÁC DỤNG

Thuốc tác động trên hệ thống tĩnh mạch bằng cách:

- Trên tĩnh mạch: làm giảm sức căng và tình trạng ứ trệ của tĩnh mạch.
- Trên tuần hoàn vi mạch: giúp bình thường hóa tính thấm mao mạch và tăng sức bền mao mạch.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng liên quan đến suy giảm tĩnh mạch bạch huyết (nặng chân, đau, hội chứng nhức chân tăng nặng vào cuối ngày).
- Điều trị triệu chứng liên quan đến trĩ cấp.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Liều dùng:

Liều thông thường: 2 viên/ngày, 1 viên vào buổi trưa và 1 viên vào buổi tối, uống vào bữa ăn.

Trị cấp: 4 ngày đầu: 6 viên/ngày; 3 ngày tiếp theo: 4 viên/ngày.

Trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của Traflon - 500 ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.

- Cách dùng:

Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Dùng thuốc này để điều trị triệu chứng đợt trĩ cấp không loại trừ việc điều trị cụ thể các bệnh hậu môn khác. Chỉ nên điều trị thời gian ngắn. Nếu các triệu chứng không thuyên giảm nhanh, cần tiến hành khám hậu môn trực tràng và đánh giá lại việc điều trị.

Cảnh báo tá dược:

- Sản phẩm chứa lactose, do đó bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp về dung nạp galactose, thiếu men Lapp lactase hoặc hấp thu glucose-galactose kém không nên dùng thuốc này.

- Sản phẩm chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) trên mỗi viên nén bao phim, do đó có thể định nghĩa là sản phẩm “không chứa natri”.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ có thai:

Không có hoặc có rất ít dữ liệu về việc sử dụng phân đoạn flavonoid tinh khiết dạng vi hạt ở phụ nữ mang thai.

Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy thuốc có độc tính sinh sản.

Để phòng ngừa, tốt nhất nên tránh sử dụng TRAFILON-500 trong thời kỳ mang thai.

Phụ nữ cho con bú:

Chưa rõ phân đoạn flavonoid tinh khiết dạng vi hạt và chất chuyển hóa của nó được bài tiết qua sữa mẹ hay không.

Không thể loại trừ nguy cơ của thuốc đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Nên đưa ra quyết định ngừng cho con bú hoặc ngừng/tránh điều trị bằng Traflon - 500 sau khi cân nhắc giữa lợi ích cho con bú với lợi ích của việc dùng thuốc ở phụ nữ.

Khả năng sinh sản

Các nghiên cứu về độc tính sinh sản cho thấy thuốc không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở chuột đực và chuột cái.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Khi lái xe và vận hành máy móc nên lưu ý rằng tình trạng chóng mặt, đau đầu có thể thỉnh thoảng xuất hiện khi đang sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có dữ liệu về tương tác thuốc



TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Những tác dụng không mong muốn dưới đây được sắp xếp theo trình tự tần suất xuất hiện:

Rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$); *thường gặp* ($1/100 \leq ADR < 1/10$); *ít gặp* ($1/1.000 \leq ADR < 1/100$); *hiếm gặp* ($1/10.000 \leq ADR < 1/1.000$); *rất hiếm gặp* ($ADR < 1/10.000$); *chưa biết* (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn).

Rối loạn hệ thần kinh:

Hiếm gặp: chóng mặt, đau đầu, khó chịu.

Rối loạn dạ dày ruột:

Thường gặp: tiêu chảy, khó tiêu, buồn nôn, nôn.

Ít gặp: viêm đại tràng.

Chưa biết: đau bụng.

Rối loạn về da và mô dưới da:

Hiếm gặp: phát ban, ngứa, mày đay.

Chưa biết: phù cục bộ vùng mặt, môi, mí mắt. Cá biệt, phù Quincke.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều

Có rất ít kinh nghiệm về việc sử dụng quá liều thuốc. Các tác dụng không mong muốn được báo cáo khi dùng quá liều thường là các rối loạn về tiêu hóa (buồn nôn, nôn, đau bụng) và các tác dụng ngoài da (ngứa, phát ban).

Cách xử trí

Xử trí quá liều nên tập trung vào việc điều trị các triệu chứng lâm sàng.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên