

TRAGUTAN[®]

Viên nang mềm

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang mềm

Cineol (Eucalyptol)	100 mg
Tinh dầu Gừng (<i>Oleum Zingiberis</i>).....	0,5 mg
Tinh dầu Tần (Húng Chanh) (<i>Oleum Plectranthi amboinici</i>).....	0,18 mg
Tá dược: Menthol, Chlorophyl, Dầu dừa, Gelatin, Glycerin, Sorbitol lỏng, Nipagin, Nipsol, Vanilin, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.	

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

- Cineol (hay Eucalyptol) có tính sát khuẩn, trị viêm cuống phổi, long đàm, hạ sốt.
- Tinh dầu Tần với thành phần chủ yếu là carvacrol có tác dụng kháng khuẩn mạnh đối với *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Pneumococcus*, *Diphtheri* v.v...
- Tinh dầu Gừng có tác dụng tiêu đàm, chống nôn, chữa ho khan tiếng, ho cảm cúm.
- Viên nang mềm Tragutan với các dược chất hoàn toàn thiên nhiên, có tính sát khuẩn đường hô hấp, hạ sốt, được dùng điều trị các chứng ho, long đàm, cảm sốt. Thuốc có hiệu quả cao và tức thời, làm dịu các cơn ho và các triệu chứng khó chịu của cảm cúm do kết hợp tính kháng khuẩn của Cineol, tinh dầu Tần, và tính chữa ho, tiêu đàm của tinh dầu Gừng. Thuốc không gây buồn ngủ và được dung nạp tốt.

CHỈ ĐỊNH:

- Sát trùng đường hô hấp, làm dịu cơn đau họng.
- Trị các chứng ho do dị ứng hầu họng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với thành phần thuốc.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi.
- Không dùng cho các trường hợp: ho do suyễn, suy hô hấp, ho do lao
- Phụ nữ có thai

THẬN TRỌNG:

Người loét dạ dày thận trọng khi dùng thuốc

Thời kỳ cho con bú:

Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ cho con bú

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc :

Không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR):.

- Đôi khi có cảm giác ấm nóng ở dạ dày.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn: mỗi lần 2 viên, ngày uống 3 lần.
- Trẻ em trên 30 tháng tuổi: mỗi lần 1 viên, ngày uống 2-3 lần.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Chưa có tài liệu nghiên cứu.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có thông tin

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

Chai 40 viên nang mềm.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Viên nang mềm TRAGUTAN đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại Nhà máy số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

601 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP. HCM

F.T. PHARMA

Điện thoại: 39700025 - 37422612

Fax: 39700182

Email: duocpham32@ft-pharma.com

Website: www.ft-pharma.com