

CÔNG TY CP TRAPHACO



MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC (Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ PVC-Nhôm)

WHO-GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:
Fexofenadin hydroclorid.....180 mg
Tá dược.....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mày đay vô căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Vị trí in
mã số mã vạch

WHO-GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Liều dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.
Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

SDK:
Lô SX:
NSX:
HD:

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 18006612
Sân xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thủy

MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC
(Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ PVC-Nhôm)



WHO-GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:
Fexofenadin hydroclorid.....180 mg
Tá dược.....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mày đay và các cơn mẩn ngứa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612
Sân xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HUNG YÊN
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên

Vị trí in
mã số mã vạch

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Traphaco®

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

TRALLERGIC

WHO-GMP

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.

- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.

- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

SĐK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thùy

MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC (Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ PVC-Nhôm)



THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:
Fexofenadin hydroclorid.....180 mg
Tà được.....vừa đủ


CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mề đay do căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Liều dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.
Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

SDK:
Lô SX:
NSX:
HD:



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thúy

MAU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC
(Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ PVC-Nhôm)



WHO-GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:
Fexofenadin hydroclorid.....180 mg
Tá dược.....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mề đay vô căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm -
Tỉnh Hưng Yên

TRALLERGIC
Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Traphaco®

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

TRALLERGIC

WHO-GMP

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

Vị trí in
mã số mã vạch

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thủy



MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC

(Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ PVC-Nhôm)

WHO - GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

TRALLERGIC
Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Fexofenadin hydroclorid 180 mg
Tá dược vừa đủ

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mày đay vô căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Bà Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm -
Tỉnh Hưng Yên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Traphaco®

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

TRALLERGIC

WHO - GMP

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

Vị trí in
mã số mã vạch

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thủy



MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC
(Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ Nhôm - Nhôm)

WHO - GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Fexofenadin hydroclorid.....180 mg
Tà được.....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mày đay vô căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 18006612
Sân xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên

Vị trí in
mã số mã vạch

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

TRALLERGIC

Traphaco®

WHO - GMP

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:

Lô SX:


HD:

Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thủy



MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC
(Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim - vỉ Nhôm - Nhôm)



THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:
Fexofenadin hydroclorid..... 180 mg
Tá dược..... vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mày đay và căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Liều dùng:
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.
Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

SDK:
Lô SX:
NSX:
HD:



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thủy



MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC
(Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ Nhôm - Nhôm)

WHO - GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg



Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:
Fexofenadin hydroclorid180 mg
Tà được.....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mày đay và các cơn mẩn ngứa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 18006612
Sân xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Vỉ trí in
mã số mã vạch

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim



Fexofenadin hydroclorid 180 mg

TRALLERGIC

WHO - GMP

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

SDK:
Lô SX:
NSX:
HD:



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thủy



MẪU NHÃN HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM TRALLERGIC
(Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim - vỉ Nhôm - Nhôm)

WHO-GMP

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:
Fexofenadin hydroclorid.....180 mg
Tá dược.....vừa đủ

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mề đay vô căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
(Xem tờ hướng dẫn sử dụng)

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN**

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm -
Tỉnh Hưng Yên

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Traphaco®

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

TRALLERGIC

WHO-GMP

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.

Cách dùng: Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

Vị trí in
mã số mã vạch

SDK:

Lô SX:

NSX:

HD:



Lô SX và HD được in dập nổi trên vỉ.

Người kiểm tra: H. Giang
Người trình bày: Thúy

TRALLERGIC
Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Traphaco®

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

TRALLERGIC
Fexofenadin hydroclorid 180 mg
Traphaco®
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Traphaco

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Hồ sơ đăng ký viên nén bao phim Trallergic

Tờ hướng dẫn sử dụng



Viên nén bao phim

TRALLERGIC

Fexofenadin hydroclorid 180 mg

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim.

Mô tả: Viên nén bao phim hình oblong, màu hồng nhạt

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Thành phần hoạt chất:

Fexofenadin hydroclorid

180 mg

Thành phần tá dược:

vừa đủ

Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Sodium starch glycolate, Natri lauryl sulfat, Colloidal silicon dioxyd, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylen glycol 6000, Titan dioxyd, Oxyd sắt đỏ

NHÓM DƯỢC LÝ: Thuốc kháng histamin

Mã ATC: R06AX26

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.
- Điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng của mày đay vô căn mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 viên/ngày.
- Người suy thận: liều khởi đầu được khuyến dùng là 1 viên fexofenadin 60 mg mỗi ngày.
- Người suy gan: không cần điều chỉnh liều.
- Người cao tuổi: không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.

Cách dùng:

Thuốc dùng đường uống với nước và trước bữa ăn. Không uống thuốc với nước hoa quả (như cam, bưởi, táo).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Cần thận trọng và điều chỉnh liều thích hợp khi dùng thuốc cho người có chức năng thận suy giảm vì nồng độ thuốc trong huyết tương tăng do thời gian bán thải kéo dài.



- Cần thận trọng khi dùng thuốc cho người cao tuổi (trên 65 tuổi) thường có suy giảm chức năng sinh lý thận.
- Độ an toàn và tính hiệu quả của Trallerbic chưa được đánh giá trên trẻ em dưới 12 tuổi.
- Không tự ý dùng thêm thuốc kháng histamin H₁ khác khi đang sử dụng fexofenadin.
- Cần ngưng fexofenadin ít nhất 24 - 48 giờ trước khi tiến hành các thử nghiệm kháng nguyên tiêm trong da.
- Dùng fexofenadin làm bệnh vẩy nến tăng lên.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ có thai:

Chưa có nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, nên chỉ dùng fexofenadin cho phụ nữ mang thai khi lợi ích cho mẹ vượt trội nguy cơ đối với thai nhi.

Phụ nữ cho con bú:

Không rõ thuốc có bài tiết qua sữa hay không, vì vậy cần thận trọng khi dùng fexofenadin cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Tuy fexofenadin ít gây buồn ngủ, nhưng vẫn cần thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Erythromycin và ketoconazol làm tăng nồng độ fexofenadin trong huyết tương nhưng không làm thay đổi khoảng QT. Không có sự khác biệt về tác dụng không mong muốn được báo cáo khi các thuốc này được dùng riêng lẻ hoặc phối hợp.
- Thuốc kháng acid chứa nhôm và magesi nếu dùng đồng thời với fexofenadin sẽ làm giảm hấp thu thuốc, vì vậy phải dùng các thuốc này cách nhau khoảng 2 giờ.
- Không ghi nhận có tương tác giữa fexofenadin và omeprazol.
- Nồng độ fexofenadin có thể bị tăng do verapamil, các chất ức chế p-glycoprotein.
- Fexofenadin có thể làm tăng nồng độ cồn, các chất an thần hệ thần kinh trung ương, các chất kháng cholinergic. Tránh dùng fexofenadin với rượu vì làm tăng nguy cơ an thần (ngủ).
- Fexofenadin có thể làm giảm nồng độ các chất ức chế acetylcholinesterase (ở thần kinh trung ương), betahistin.
- Fexofenadin có thể bị giảm nồng độ bởi các chất ức chế acetylcholinesterase (ở thần kinh trung ương), amphetamin, các chất kháng acid, nước ép quả bưởi, rifampicin.
- Nước hoa quả (cam, bưởi, táo) có thể làm giảm sinh khả dụng của fexofenadin đến 36%.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các nghiên cứu lâm sàng có đối chứng với giả dược cho thấy tỷ lệ tác dụng không mong muốn ở nhóm người bệnh dùng fexofenadin tương tự như ở nhóm dùng giả dược.

Thường gặp (>1/100)

- Thần kinh: buồn ngủ (1,3 - 2,2%), mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, chóng mặt.
- Tiêu hóa: buồn nôn, khó tiêu.
- Khác: dễ bị nhiễm siêu vi (cảm, cúm), đau bụng kinh, dễ bị nhiễm khuẩn hô hấp trên, ngứa họng, ho, sốt, viêm tai giữa, viêm xoang, đau lưng.

Ít gặp (>1/1.000, <1/100)

- Thần kinh: sợ hãi, rối loạn giấc ngủ, ác mộng.
- Tiêu hóa: khô miệng, đau bụng.

Hiếm gặp (<1/1.000)

- Da: ban da, mề đay, ngứa.
- Phản ứng quá mẫn: phù mạch, tức ngực, khó thở, đỏ bừng, choáng phản vệ.

Không rõ tần suất (không thể ước tính từ dữ liệu hiện có):

- Tim mạch: tăng nhịp tim, hồi hộp.
- Tiêu hóa: tiêu chảy.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Quá liều:

Các báo cáo về quá liều của fexofenadin ít gặp và thông tin về độc tính cấp còn hạn chế. Tuy nhiên, buồn ngủ, chóng mặt, khô miệng đã được báo cáo.

Cách xử trí:

Sử dụng các biện pháp thông thường để loại bỏ phần thuốc chưa được hấp thu ở phần ống tiêu hóa. Điều trị triệu chứng và nâng đỡ tổng trạng. Lọc máu làm giảm nồng độ thuốc trong máu không đáng kể (1,7%). Không có thuốc giải độc đặc hiệu.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN

Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Người soạn thảo: Nguyễn
Người kiểm tra: Yến
Ngày kiểm tra: 25/04/2023