

170 /Đ139



MẪU NHÃN HỘP THUỐC NHỎ MẮT TRANOCIN





CÔNG THỨC: Cho 5 ml Ciprofloxacin hydrochlorid tương đương Ciprofloxacin.....15 mg Tá dược.....vừa đủ.....5 ml

CHỈ ĐỊNH:
- Điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với Ciprofloxacin gây ra như loét giác mạc, viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm túi lệ, viêm mí mắt...
- Phòng ngừa trước khi mổ mắt, điều trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật mắt.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem toa hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.



KT: 30mm x 70mm x 30mm

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

MẪU NHÃN LỌ THUỐC NHỎ MẮT TRANOCIN



NK



Toa hướng dẫn sử dụng

Dung dịch thuốc nhỏ mắt TRANOCIN

TRÌNH BÀY: Hộp 1 lọ 5 ml

CÔNG THỨC: cho 5 ml

Ciprofloxacin hydroclorid tương đương Ciprofloxacin	15 mg
Tá dược: (Acid acetic, Natri acetat, Natri clorid, Dinatri edetat, Benzalkonium clorid, Nước cất) vừa đủ 5 ml	

DUỐC LÝ:

DUỐC LỰC HỌC:

Ciprofloxacin là một kháng sinh tổng hợp thuộc nhóm Quinolon, có phổ kháng khuẩn rộng. Cơ chế tác dụng là ức chế enzyme DNA girase nên thuốc ngăn sự sao chép của chromosom gây kìm hãm sự sinh sản của vi khuẩn. Ciprofloxacin có tác dụng tốt với các vi khuẩn kháng lại kháng sinh thuộc các nhóm khác (aminoglycosid, cephalosporin, tetracyclin, penicilin,...) và được coi là một trong những thuốc có tác dụng mạnh nhất trong nhóm fluoroquilolon.

Ciprofloxacin có phổ kháng khuẩn rất rộng, bao gồm phần lớn các vi khuẩn gram âm gây bệnh quan trọng, kể cả *Pseudomonas* và *Enterobacter* đều nhạy cảm với thuốc. Với các chủng vi khuẩn gram dương, nói chung kém nhạy cảm hơn. Ciprofloxacin không gây phản ứng chéo với các kháng sinh khác như aminoglycosid, beta-lactam nên các vi khuẩn đề kháng các thuốc này có thể nhạy cảm với Ciprofloxacin.

DUỐC ĐỘNG HỌC:

Ciprofloxacin dùng đường nhỏ mắt được hấp thu toàn thân. Nửa đời trong huyết tương là khoảng 3,5 đến 4,5 giờ ở người bệnh có chức năng thận bình thường. Thuốc được phân bố rộng khắp và có nồng độ cao ở những nơi bị nhiễm khuẩn, thuốc dễ ngấm vào mô. Nồng độ trong mô thường cao hơn nồng độ trong huyết thanh, Ciprofloxacin đi qua nhau thai và bài tiết qua sữa mẹ. Thuốc được đào thải chủ yếu dưới dạng không đổi qua nước tiểu nhờ lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống thận, một phần nhỏ qua phân. Thuốc được đào thải hết trong vòng 24 giờ.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với Ciprofloxacin gây ra như loét giác mạc, viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm túi lệ, viêm mi mắt,... Phòng ngừa trước khi mổ mắt, điều trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật mắt.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- *Nhiễm khuẩn nặng:* Nhỏ 1- 2 giọt vào kết mạc, cứ mỗi 30 phút 1 lần trong ngày đầu tiên, ngày thứ hai mỗi giờ nhỏ 1 lần và 4 - 6 lần/ ngày từ ngày thứ 3 trở đi, thời gian điều trị có thể từ 1- 2 tuần. Đối với trường hợp loét giác mạc, thời gian điều trị có thể kéo dài hơn 14 ngày nếu chưa có hiện tượng tái tạo biểu mô hoàn toàn.

- *Nhiễm khuẩn nhẹ và trung bình:* Nhỏ 1- 2 giọt vào kết mạc x 3 - 4 lần/ ngày.





CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người có tiền sử dị ứng với kháng sinh quinolon.

THẬN TRỌNG:

- Khi dùng kéo dài có thể tạo ra những chủng vi khuẩn đề kháng, kể cả nấm. Nếu có bội nhiễm, nên áp dụng trị liệu thích hợp.
- Độ an toàn và hiệu quả điều trị khi sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi chưa được khẳng định. Mặc dù Ciprofloxacin và các dẫn xuất quinolon khác gây bệnh về khớp khi thử nghiệm dùng bằng đường uống trên một loài chó săn còn nhỏ, việc dùng tại chỗ trên mắt của Ciprofloxacin trên các động vật thử nghiệm còn nhỏ không cho thấy gây ra một bệnh lý nào trên khớp và không có bằng chứng cho thấy dạng dùng trong nhãn khoa có một tác dụng nào trên các khớp xương chịu trọng lượng cơ thể.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Trong thời kỳ thai nghén, dung dịch nhỏ mắt Ciprofloxacin chỉ nên dùng khi đã cân nhắc giữa ích lợi và nguy cơ cho thai.
- Trong thời kỳ cho con bú: Không dùng ciprofloxacin cho người cho con bú, vì ciprofloxacin tích lại ở trong sữa và có thể đạt đến nồng độ có thể gây tác hại cho trẻ. Nếu mẹ buộc phải dùng ciprofloxacin thì phải ngừng cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tác dụng không mong muốn sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt Ciprofloxacin bao gồm: nóng rát hoặc khó chịu tại chỗ, gây tua giác mạc hoặc nhuộm màu giác mạc hoặc gây sợ ánh sáng.

Thuốc có thể gây một số hiện tượng quá mẫn như khó chịu, đau hoặc ngứa mắt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có nghiên cứu đặc hiệu về tương tác thuốc được thực hiện với Ciprofloxacin nhỏ mắt.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU:

Khi quá liều tại chỗ do dung dịch nhỏ mắt có thể dùng nước ấm hoặc nước muối sinh lý để rửa mắt.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh